

소화불량 · 구토

네오부틴서방정 Neobutin SR Tab.

(트리메부틴말레산염)

【원료약품 및 분량】 1정 중
트리메부틴말레산염(KPC) 300mg

【성상】
흰색의 달걀형 필름코팅정제

【효능·효과】
위·식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장궤양 등에 수반되는 동통, 소화불량, 구역, 구토, 기능적 결장질환(과민성대장염, 경련성결장), 유소아의 습관성구토, 비감염성의 장관통과기능장애(설사, 변비), 유소아의 동요, 자극 수면장애, 소화관수술후의 정폐색, 엑스선(내시경)검사시의 유문 및 결장경련의 완화

【용법·용량】
1일 2회 1회 1정 공복시 복용

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 경우에는 신중히 투여할 것
동물시험에서 최기형성은 없었으나 임신 중 사용에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 후 첫 3개월 동안 및 수유기 때의 투여는 피하는 것이 바람직하다.
3. 부작용
드물게 피로감, 열작감이나 한기, 가벼운 설사, 구역, 구토, 변비, 소화장애 및 약간의 최면상태, 경미한 현기증이 나타날 수 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 120정

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 제정경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지, www.skynewpharm.com이나 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품정보 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2011. 4. 25 (Rev. 0)