

고단위영양제 메가백정

- 신진대사에 필수적인 비타민의 공급: 탄수화물 · 지방대사
- 비타민B군의 수요가 증대하는 경우
: 육체적 · 정신적 스트레스/간기능/당뇨/이노제 보조
- 수험생 B₁, B₆, B₁₂
- Lipotropic factor(콜린, 이노시톨)함유
- Vitamin Bx(PABA)함유

메가백정은 체내의 여러 대사과정에 필수적인 보호소로 쓰이는 비타민 B군을 고함량으로 함유하고 있어 신진대사를 활성화 시키며 육체적 정신적 스트레스등 비타민 B군의 요구량이 증가하는 다양한 경우에 비타민 보급제로 효과적입니다. 아울러, Lipotropic factor인 콜린과 이노시톨을 함유하고 있어 간장의 지방대사에 도움을 줍니다. 메가백정의 모든 성분은 음식물로도 섭취가 가능한 비타민으로 구성되어 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

주석산수소콜린(DAB).....	100.0mg
이노시톨(KP).....	100.0mg
파라아미노인산(USP).....	100.0mg
티아민염산염(KP).....	100.0mg
리보플라빈(KP).....	100.0mg
니코틴산아미드(KP).....	100.0mg
판토텐산칼슘(KP).....	108.7mg
피리독신염산염(KP).....	100.0mg
비오틴(USP).....	100.0μg
폴산(KP).....	100.0μg
0.1%시아노코발라민(KPC).....	100.0mg

【성상】 주황색 타원형의 필름코팅정

날알식별정보: 앞면 (L)S 뒷면 (M)G

【효능 효과】

비타민B군 결핍증의 예방 및 치료 또는 수요가 증대하는 다음 경우의 보급

1. 수술전후 회복기 환자
2. 스트레스 상태: 항생제 · 이노제의 보조요법, 간질환, 수유성 비타민의 흡수 · 섭취를 방해하는 위장관장애, 지속성 또는 소모성 질환, 당뇨병, 화상, 골절, 중증감염, 심리적 장애

【용법 용량】 성인: 1일 1회 1정을 복용합니다.

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
2) 약성분인 또는 이 약의 1차성, 2차성 빈혈 환자에게 치료의 목적으로 사용하지 않습니다.
3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오: 레보도파
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 · 수유부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 위부불쾌감, 위부팽만감, 복부팽만감
2) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
3) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있습니다.

- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia: 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 임상검사치에의 영향
요를 황색으로 변화시켜 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】 30정, 90정

【참고문헌】

AHFS Drug Information (American Society of Health System Pharmacists) 2000
비타민 합본(한국비타민정보센터) 1997
임상약리학(청구문화사) 1996
약물학(대한약학대학협회) 9개정 2005
의학용어대사전(지제근저) 2004

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문 사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상의 하십시오.
- 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- 이 첨부문서 작성일자(2010년 1월 5일) 이후 변경된 내용은 소비자상담전화 02-843-1500에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(ezdrug.kda.co.kr) 의약품정보를 참조 하십시오.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭-보고마당-안전성정보-)의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.
- 본 제품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽어아하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.
- 본 제품에 대한 의문사항은 소비자상담전화 02-843-1500으로 문의하십시오.
- 약액을 연 후 2개월 이상 복용하지 않을 경우 건조한 곳(냉장고 등)에 보관해 주십시오.
- 제 조 자: 한국콜마(주)/충남 연기군 전의면 신정리 618-3

• 판 매 자



경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr

(개정연월일: 2010. 01. 05)