



눈은 인체에 있어서 매우 중요한 기관이며, 이 눈의 기능을 정상화하는데 없어서는 안 될 성분인 바로 눈물입니다. 기본적인 눈물은 하루종일 일정량 지속적으로 생성되어 눈의 전면에 눈물층(tear film)을 형성하여 눈을 부드럽게 윤활시켜주고 살균작용도 합니다. 하지만 여러가지 이유로 이 기본적인 눈물이 부족하거나 그 성분에 변동이 생겨 눈물층에 이상이 생기면 여러가지 불편한 증상을 일으키게 되며 이러한 증상이 있는 경우를 통틀어 안구건조증이라 합니다. 모아티스 점안액은 천연 눈물 성분과 거의 유사한 인공눈액(눈물제입니다. 모아티스 점안액은 눈물 분비가 충분치 않을 때 뿐만 아니라, 콘택트렌즈 착용시에도 사용가능합니다. 어떤 종류의 콘택트렌즈를 착용한 경우에도 사용이 가능하며, 콘택트렌즈를 착용한 채 눈에 직접 넣을 수 있는 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

염화나트륨(KP)	5.5mg
(총 나트륨으로서 2,2364mg/총 염소로서 4,0496mg)	
염화칼륨(KP)	1.5mg
(총 칼륨으로서 0.7867mg)	
보존제 : 클로르헥시딘글루콘산염액 (BP)	0.25μl
(클로르헥시딘글루콘산염으로서 0.05mg)	
첨가제 : 붕산, 불사, 히드록시에틸셀룰로오스, 에데트산나트륨수화물, 폴리소르베이트 80, 주사용수	

【성 상】

무색투명한 용기에 든 무색투명한 액

【효능 · 효과】

눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조), 하드콘택트렌즈 및 소프트렌즈 착용시의 불편감, 눈의 침침함(눈곱이 많은 때 등)

【용법 · 용량】

1회 2-3방을 1일 5-6회 점안(눈에 넣음)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 눈의 통증이 심한 환자
- 2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 녹내장 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 부작용(이상반응)

이 약의 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.



- 2) 하드콘택트렌즈를 착용하는 사람에서 눈곱 등의 분비물이 많은 경우, 드물게 렌즈가 흐리게 되는 일이 있으므로 이와 같은 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
- 3) 이 약의 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 2주 정도 투여후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
- 5) 사용기한을 초과한 것은 투여하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 한 빨리 사용한다.

4. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로서 사용한다.
- 2) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 잔균(균) 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림) 될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 않는다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】

기밀용기, 차광하여 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

15mL

- * 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변색 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2014. 12. 02