

하이테크 바이오 공음료

[illegible]

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
간헐적인 두통이나 졸음 등이 있을 경우 따라가도록 한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
① 이전에 다음 중의 하나 이상을 경험하였거나 1주일 이상 2시간의 치로를 필요로 하는 사람 ② 임신 중이거나 임신 중이 아닐지라도 임신을 계획하고 있는 사람 ③ 치과의사, 약사와 상의한 후, 삼킴시 가능한 이 침투성분을 소화할 것 ④ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 100mg 이하의 용량으로 시작할 것 ⑤ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑥ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑦ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑧ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑨ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑩ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑪ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑫ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑬ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑭ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑮ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑯ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑰ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑱ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑲ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ⑳ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉑ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉒ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉓ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉔ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉕ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉖ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉗ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉘ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉙ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉚ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉛ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉜ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉝ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉞ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㉟ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊱ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊲ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊳ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊴ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊵ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊶ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊷ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊸ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊹ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊺ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊻ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊼ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊽ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊾ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우 ㊿ 1회 복용량이 100mg 이하인 경우

■참가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
■참가제(다르کت소): 청색1호일무미닐레리크, 황색203호
■기타 참가제: 디아세틸모노글리세라이드, 미질정성설탕로
오스, 산화티타, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산,
트름, 열크, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀
룰로스, 히프록셀로스



3 806473 0137 12