

레보솔 정

(레보드로프로피진)

LEV 2015.03.03-03

레보솔 정

(레보드로프로피진)

전문약품
분류번호:222

LEVOSOL Tab.

【원료약품의 분량】 이 약 1정 중
레보드로프로피진(EP) 60mg
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

【성 성】 흰색의 원형정제

【효능·효과】
다음 질환에서의 가치 : 급·만성기관지염

【용법·용량】
성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
2) 기관지 점액 분비 증가 환자
3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
5) 중증의 간장애 환자
6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
2) 고령자
3) 만 2세 미만의 영아
3. 이상반응
1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
3) 순환기계 : 심계항진
4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응
4. 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.
5. 상호작용
에민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 자사포장단위

【제 조 자】 주식회사 파마킹 (충청북도 음성군 감곡면 행군이길 87-17)

♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구 입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
♣ 이 설명서의 개정일자 2015년 03월 03일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com)또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확 인할 수 있습니다.
♣ 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
LEV 2015.03.03-03

제조의뢰 · 판매자
우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사 · 공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211