

엑스프리벤정

바쁘고 복잡한 사회생활 속에서 현대인들은 과도한 스트레스, 불규칙한 생활습관, 수면부족과 더불어 운동부족, 영양과다 등으로 인해 비만, 대사성질환, 성인병과 같은 여러 위험에 노출되어 있습니다.

특히 대사증후군은 여러 질병의 원인으로 현대인의 건강을 위협하고 있습니다. 대사증후군을 예방하고 심각한 질환으로 발전하는 것을 막기 위해서는 규칙적이고 균형 잡힌 식생활, 적절하고 규칙적인 운동 등 생활습관의 개선이 중요하며 항산화기능을 포함하여 대사과정에 도움을 주는 성분을 함유한 제제를 꾸준히 복용하는 것이 좋습니다. 그리고 정기적으로 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 체크하여야 하며 체중이 과다한 사람은 체중뿐만 아니라 복부비만도도 체크하는 것이 필요합니다. 물론 자신의 건강관련 수치는 항상 기억하고 염두에 두어야 합니다.

엑스프리벤은 항산화제인 비타민C, 셀레늄, 크롬, 코엔자임큐텐을 함유하며 다양한 비타민과 미네랄을 적절히 포함하여 인체 대사과정에 도움을 주는 제제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

- 유효성분:
- | | |
|-------------------|----------|
| 아스코르브산 과립97%(별규) | 335.05mg |
| (아스코르브산으로서 325mg) | |
| 유비데카레논(KP) | 5mg |
| 피리독신염산염(KP) | 12.5mg |
| 시아노코발라민(KP) | 0.25mg |
| 폴산(KP) | 0.25mg |
| 티아민질산염(KP) | 15mg |
| 리보플라빈(KP) | 12.5mg |
| 산화아연(KP) | 9.33mg |
| (아연으로서 7.5mg) | |
| 산화마그네슘(KP) | 165.8mg |
| (마그네슘으로서 100mg) | |
| 크롬함유건조효모(KP) | 50mg |
| (크롬으로서 25μg) | |
| 셀레늄함유건조효모(KP) | 46.3mg |
| (셀레늄으로서 25μg) | |
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 오파드라이빨간색(200F650003), 오파드라이흰색(03B28796), 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】

적갈색의 타원형 필름코팅정

D

X

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 신경통, 근육통, 관절통[요통(허리통증), 건통(어깨통증) 등], 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
- 아연의 보급

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 2정 복용 또는 1일 2회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자

- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제(미네랄 함유제제)
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산요증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 8) 당뇨병환자
 - 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부 통증, 저혈압, 폐부종(폐부기)
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 3) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 하십시오.
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】

120정

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【최종 개정연월일】

2017. 08. 01

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통기한 중 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성일자(2017년 8월 1일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약은 습도가 높으면 인습의 우려가 있으므로, PTP를 개봉하여 조제하지 마시고 복용시 까지 PTP 포장상태로 보관하십시오.

제조원

dalim다림바이오텍

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107
대표전화 : 02) 335-1656
공장 및 연구소 : 031) 353-6091
소비자상담실 : 080) 333-1656(수신자부담)