

잇몸질환 치료제

이에존[®] 캡슐

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

이에존캡슐은 잇몸질환의 원인균에 대해 직접적인 살균효과가 있으며 모세혈관의 저항성 증강 및 투과성 억제로 출혈증상을 없애줍니다.

이에존캡슐은 잇몸 조직의 혈액순환을 원활히 함으로써 손상된 잇몸에 수분을 공급하고 발적과 부종을 완화시킵니다. 또한 치조연골조직, 잇몸조직의 구성성분인 콜라겐의 생합성을 촉진하여 손상된 잇몸조직의 재생을 촉진하는 등 잇몸 질환의 원인 및 증상을 제거해 주므로 건강한 잇몸 유지에 필요한 잇몸질환치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

염화리소짐(KPC)	30mg
제피아스코르브산(KPC)	156.25mg
(아스코르브산으로서 150mg)	
토코페롤아세테이트50%(KPC)	60mg
(토코페롤로서 30 I.U.)	
클로로필린구리나트륨착염(KPC)	20mg
첨가제(타르색소): 적색3호, 청색1호	

【성상】

질은 청록색 가루가 든 상.하부 담청색의 경질캡슐

【효능·효과】

치은염·치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적·부기·출혈·고름 등)의 완화

【용법·용량】

성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 난백 알레르기 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 아토피피부염, 기관지천식, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소

인이 있는 환자.

2) 양친 형제 등이 알레르기 증상의 병력이 있는 환자.

3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들어 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)의 병력이 있는 사람.

3. 부작용

1) 속

드물게 속이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면창백, 사지냉감, 혈압 강하, 청색증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다.

2) 과민증

때때로 발진, 발적 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

3) 소화기계

설사, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염 등이 나타날 수 있다.

4) 피부

스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

5) 유아에서 이 약에 함유된 염화리소짐을 처음으로 복용했을 때, 속(아나필락시스)이 나타났다는 보고가 있으므로 복용 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

(3세 미만의 용법이 있는 내용액제, 시럽제에 한함.)

【포장단위】 10, 120, 240

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 오용을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

* 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

* 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품 문의처로 문의하십시오.

* 이 사용설명서 개정년월(2009년 10월)이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎080-024-5525)에서 확인하실 수 있습니다.

제조외뢰자 : 현대약품주식회사

충청남도 천안시 풍세면 남관리 200

제조사 : 청계제약주식회사

경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4

♣ 제품문의처 : ☎ 080-024-5525

사용설명서 개정년월 : 2009. 10.



현대약품(주)