



카리토 포텐

연질캡슐

[쿠쿠르비트종자유엑스(15~25→1)]
Carito Poten Soft Capsule

RTS-001

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중,

- 유효성분 : 쿠쿠르비트종자유엑스(15~25→1)(별규)..... 500.00mg
- 첨가제(동물유래성분) : 속신산젤라틴(돼지-가족)
- 기타첨가제 : 농글리세린, 비결정성소르비톨, 산화티탄, 에틸바닐린, 카카오색소

[성상] 진녹색의 유상액을 함유한 초콜렛색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 잔노감(소변을 누고난 후에도 다는 것 같지 않은 느낌)은 없으나 야뇨, 빈뇨 증상 및 요배출량이 감소(초당 10 mL~15 mL 사이)한 전립샘 비대에 의한 배뇨(소변을 누)장애
2. 잔노감(소변을 누고난 후에도 다는 것 같지 않은 느낌)(50mL 전후)이 있고 야뇨, 빈뇨 증상 및 요배출량이 감소(초당 10 mL 이하)한 전립샘 비대에 의한 배뇨(소변을 누)장애

[용법·용량] 성인 : 쿠쿠르비트종자유엑스로서 1회 500 mg을 1일 2회, 물과 함께 식전에 복용한다

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약(호박성분)이나 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
당성분(말티톨, 소르비톨) 소화장애가 있는 환자(이 약은 소르비톨을 함유하고 있으므로 특정 당성분을 소화하기 어려운 환자)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한한 이첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 사용한 경험에 있는 2,245명을 후향적으로 조사한 결과 속쓰림, 위통, 구역 등의 위장장애가 나타났다.
2) 알파치단제와 병용(함께 복용)한 환자에서 혈압저하, 피부반응, 어지럼 등이 보고 되었음.
3) 이 약을 포함한 다른 유사 약물에서 드물게 구역, 구토 등의 증상이 나타났다.
4) 과량 복용 시 강한 신경과민 반응이 나타날 수 있음.
5) 매우 드물게 가려움, 발진(두드러기), 얼굴부종(부기), 호흡곤란(알레르기성 혈관부종)이 나타날 수 있음.
6) 1일 10g 이상 복용하는 경우 경증(가벼운 증상)의 설사가 나타날 수 있음(소르비톨 함유 제제).
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 이 약은 대증요법(증상별로 치료하는 방법)제로서 전립샘 비대증을 근본적으로 치료하지 못하므로 증상이 개선되지 않거나 악화되면 반드시 의사의 진찰을 받을 것.
2) 투여 간격을 지키지 못한 경우에도 2회 투여량을 일시에 복용하지 말 것.
3) 혈뇨나 급성치질 증상이 나타나는 경우에는 반드시 의사의 진찰을 받을 것.
4) 이 약과 음식물과의 상호작용은 알려지지 않았음.

5) 이 약과 다른 약물과의 상호작용은 알려지지 않았으나 다른 약물과 복용 시 반드시 의사 또는 약사와 상의할 것.

6) 이 약의 복용과 운전 등의 기계조작과의 연관성은 알려지지 않았음.

[저장상의 주의사항]

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 25℃ 이하에서 직사광선을 피해 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[주의]

1. 온도가 높은 곳에 보관 시 캡슐이 변형될 수 있으므로 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 포장에 개봉하여 복용 시 가름 제품에 포장물(알루미늄 호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용 시 캡슐에 포장물이 부착되어 있는지 확인하고 캡슐만 복용하십시오.
3. 제품 개봉 또는 취급 시에 포장재(알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
4. 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의하십시오.

[포장단위] 60캡슐(10캡슐/PTP포장 X 6)

[저장방법] 기밀용기, 상온(15~25℃)이하 보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678 : 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조의회사 : **Dongkook** 동국제약(주)

충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

제 조 자 : **(주)알파바이오**

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

설명서 최종 개정 연월일 : 2021. 11. 15