

황산콘드로이틴 300mg 함유 복합비타민

300

CONDROBIG 300 Soft caps.

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

황산콘드로이틴나트륨 (KPC)	300mg
푸로실타이민(KPC)	25mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	15mg
시아노코발라민(KP)	30 µg
토코페롤아세테이트(KP)	50mg
(비타민D로서 50 IU)	
감마오리자놀(KPC)	5mg
첨가제 : 타르색소(적색40호, 청색1호, 황색203호, 황색5호)	
동물유래성분 : 젤라틴(소, 가축)	

【성상】 황색의 내용물이 충전된 초콜렛색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민(E, B1, B2, B6)의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
2. 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
3. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부부염
4. 각기
5. 눈의 피로

【용법·용량】 성인 및 8세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부, 수유부
 - 3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
3. 이상반응
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. : 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕 부진, 복부 팽만감
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10µg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물을 병용 투여하지 않습니다. 1) 레보도파
6. 임상검사에의 영향 : 요(소변)를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
 - 3) 오용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호 : 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 【포장단위】 60캡슐, 120캡슐 【소비자상담실】 02)834-2607

【제조원】 (주) 동구제약 / 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

- * 최신의약품정보 : 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 참조 * 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오. * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시된 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성일(2010년 10월 27일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

판매원 : (주) 유한메디카

충북 청원군 오창읍 양청리 807-1