

엘도브론캡슐300밀리그램 (에르도스테인)

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중
에르도스테인(별규) 300mg

[성상]
흰색의 분말이 들어있는 상부 암록색, 하부 황색의 경질캡슐제

[효능 · 효과]
급 · 만성 호흡기질환에서의 점액옹해 및 거담

[용법 · 용량]
성인: 에르도스테인으로 1회 300 mg을 1일 2~3회 경구 투여한다.
급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자(이 약의 대사물인 메티오닌 대사를 방해할 수 있다.)
 - 소화성궤양 환자
 - 중증 신장장애(크레아티닌청소율이 <25 mL/min) 환자
 - 중증 간장애 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 경증 및 중등도 간장애 환자(이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300 mg을 초과해서는 안 된다.)
- 이상반응
 - 사용량보다 과량투여(1일 1200 mg이상)시 발한, 어지러움, 홍조가 나타났다.
 - 신경계 : 두통
 - 호흡기계 : 감기, 호흡곤란
 - 소화기계 : 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통, 속쓰림
 - 피부 : 두드러기, 홍반, 습진
 - 국내 시판 후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진, 얼굴부종, 전신부종, 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진
- 상호작용
거담제는 기침약과 병용투여 시 기침 완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지연축을 야기할 수 있으므로 특히 주의한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
동물실험에서 수태, 태자의 배자발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 직·접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 30T/병, 300T/병

[제품문의처] 02)3485-0476

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서 최종 개정연월일(2017.01.12) 이후 변경된 내용은 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색' 란을 통해 확인하실 수 있습니다.

제조사 **한 국 콜 마 (주)**

세종특별자치시 전의면 산단길 245