

모사메드 (정) 5mg Mosamed (tab) 5mg

(모사프리드 시트르산염 이수화물)

(Mosapride citrate · 2H₂O)

【원료약품의 분량】 이 약 1정 (135.0mg)중

모사프리드 시트르산염 이수화물 (별규) 5.29mg

(모사프리드 시트르산염 무수물로서 5mg)

※ 첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (KP) 59.51mg

【성상】

이 약은 분할선을 가진 백색의 장방형 필름코팅정제입니다.

【효능·효과】

기능성 소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능이상(가슴쓰림, 오심(구역), 구토)

【용법·용량】

통상, 성인에게는 모사프리드 시트르산염 무수물로서 1일 15mg을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이상반응

998례 중 40례 (4.0%)에서 이상반응이 나타났습니다. 주요한 이상반응으로는 설사·연변 (1.8%), 구갈 (0.5%), 권태감 (0.3%) 등이 있습니다. 임상검사치에서는 792례 중 30례 (3.8%)에서 이상변동이 보였습니다. 주요 내용으로는 호산구증가증 (1.1%), 중성지방의 상승 (1.0%), AST(GOT), ALT(GPT), ALP 및 γ -GTP의 상승 (각 0.4%) 등이 있습니다.

1) 중대한 이상반응

극중간염, 간기능장애와 황달 (각 0.1% 미만) :

극중간염, 현저한 AST(GOT), ALT(GPT), γ -GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능장애, 황달이 나타나는 경우가 있고 사망에 이르는 예도 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 확인되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시하십시오.

2) 기타 이상반응

과민증 : 발진, 두드러기, 때때로 부종

혈액계 : 때때로 호산구증가, 백혈구감소

소화기계 : 복부팽만감, 구강마비 (혀와 입술을 포함), 때때로 설사, 연변, 구갈, 복통, 구역, 구토, 미각이상

간장 : 때때로 ALP의 상승, 빌리루빈 상승

순환기계 : 때때로 심계항진

정신신경계 : 때때로 어지러움, 휘청거림, 두통

기타 : 떨림, 때때로 권태감, 중성지방의 상승

3) 국내 시판후 조사결과

국내에서 채집사를 위하여 6년 동안 745명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응의 발현증례율은 인과관계 여부와 상관없이 1.9% (14례/745례)로 보고되었고 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.3% (10례/745례)입니다. 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 복통, 설사 각 4례, 묽은 변 3례, 오심 2례, 복부팽만, 소화불량, 유즙과생산, 권태, 발진 각 1례로 나타났습니다. 이 중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 유즙과생산이 각 1례씩 보고되었습니다.

3. 일반적 주의

일정기간(보통 2주) 투여하여도 소화관 증상의 개선이 보이지 않을 경우 장기간 투여하지 마십시오.

4. 상호작용

본제의 소화관운동촉진작용은 골관절통증 신경과의 관련성으로 인해 항콜린제(황산아트로핀, 브롬화부틸스코폴라민 등)와 병용 투여시 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용 간격을 두는 등 병용에 주의해야 합니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오. (임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.)

2) 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단하십시오. (실험동물에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있습니다.)

6. 소아에 대한 투여

소아 등에 대한 안전성이 확립되어있지 않습니다.(사용경험이 없습니다.)

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발현된 경우에는 감량(예, 1일 7.5mg)하는 등 적절한 처치를 하십시오.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

9. 기타

설치류에 임상통상용량의 100-300배 (30-100mg/kg_{체중}) 을 장기간 경구투여한 시험(랫트 104주, 마우스 92주간)에 있어 종창(간세포선종 및 갑상선여포성 종창) 발생률의 상승이 나타났습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 30T, 100T

“ 약국 등의 개설자에 한하여 사용기한이 경과되었거나 변질·변패, 오손된 의약품 또는 부작용 등은 본사 마케팅부(수신자 부담 : 080-555-7171)에서 상담 및 교환, 교품해드립니다. 그리고 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화:080-333-6312로 연락바랍니다.”

설명서작성년월일 : 2010. 12. 9.
GM-B-0000-KC-01

“ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.”

제조판매원



제일약품

본사:서울특별시 서초구 반포동 745-5
공장:경기도 용인시 처인구 백암면 근곡리 117-1