

3세대 알레르기 치료제

세노바·엘액

(레보세티리진염산염)

전문약약품

분류번호

141
(항히스타민제)

원료약품의 분량 (100mL 중)

레보세티리진염산염(별규) 0.05g
첨가제(보존제) : 벤조산(KP) 0.1g

성상

이 약은 갈색 유리병 혹은 플라스틱병에 든 무색 투명한 용액입니다

효능·효과

다증질환의 증상 완화

1. 계절성 알레르기 비염 또는 다년성 알레르기 비염 (지속적 알레르기성 비염 포함)
2. 만성 특발성 두드러기
3. 가려움증을 동반한 피부병 및 습진(하이드로코티손 외용제와 병용): 성인 및 6세 이상의 소아에 한함

용법·용량

- 성인 및 6세 이상의 소아 : 식사와 관계없이 1회 레보세티리진염산염으로서 5mg(액제로서 10mL), 1일 1회 복용합니다.
- 6세 미만 2세 이상의 소아 : 1회 1.25mg(액제로서 2.5mL), 1일 2회 복용합니다.
- 2세 미만 1세 이상의 소아 : 1회 1.25mg(액제로서 2.5mL), 1일 1회 경구투여합니다.
1세 미만의 영아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않습니다.

신장에 성인환자는 신장기능(크레아티닌 청소율(C_{CR} (mL/min))에 따라 용량을 조절합니다.

크레아티닌 청소율 C _{CR} (mL/min)		용량 및 횟수
경증	50 ≤ C _{CR} < 80	1회 5mg, 1일 1회
중등증	30 ≤ C _{CR} < 50	1회 5mg, 2일 1회
중증	10 ≤ C _{CR} < 30	1회 5mg, 3일 1회

신장에 소아환자는 신장기능(크레아티닌 청소율(C_{CR} (mL/min)) 및 체중에 따라 감량합니다.

사용상의 주의사항

복용하기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하십시오.

1. 다음환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 성분 및 히드록시진 또는 피페라진유도체에 대해 과민증이 있는 환자 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 신부전 환자(C_{CR} < 10mL/min), 혈액투석을 받고있는 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 4) 1세 미만의 영아에게 이 약을 투여해서는 안되고,

6세 미만의 유아에게는 정제가 아닌 액제를 투여하여야 합니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 신장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
- 2) 간장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
- 3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중감, 흥분이 나타날 수 있습니다.
- 2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕 부진, 위부불쾌, 소화불량, 복통, 위통, 복부 불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상 나타날 수 있습니다.
- 3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 4) 혈액계 : 혈관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 임파구증가, 호산구증가, 드물게 단핵구증가, 혈소판증가, 혈소판감소가 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시스 속, 때때로 부종, 드물게 발진, 소양감, 혈관부종이 나타날 수 있습니다.
- 6) 눈 : 드물게 시야흐림, 결막충혈이 나타날 수 있습니다.
- 7) 간 : 때때로 AST, ALT, AI-P, 총빌리루빈의 상승이 나타날 수 있습니다.
- 8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요착혈이 나타날 수 있습니다.
- 9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력 이상, 시각이상, 때때로 홍통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있습니다.
- 10) 1세 이상 6세 미만의 소아에 대한 임상시험 결과, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 발열, 설사, 구토, 중이염이었습니다.
- 11) 시판 후, 공격성, 환각, 우울, 경련, 지각이상, 호흡 곤란, 두드러기, 고정약물발진, 시각장애, 간염, 근육통, 체중증가, 식욕증가, 불면, 자살관념, 현기증, 실신, 진전, 미각이상, 배뇨장애, 요저류, 부종이 추가로 보고되었습니다.
- 12) 국내 시판 후 조사결과

가. 국내에서 재심사를 위하여 4년 동안 1,866명(정제 : 1,701명, 액제 : 165명)의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 유해사례의 발현율은 1.13% (21명/1,866명 25건)이었습니다. 주 유해사례는 졸림 0.27%(5명/1,866명), 진정 0.21%(4명/1,866명), 어지러움 0.11%(2명/1,866명)등의 순이었습니다. 이 중 약과의 인과 관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 0.64%(12명/1,866명, 12건)으로 보고되었으며

졸림 0.27%(5명/1,866명), 진정 0.21%(4명/1,866명), 어지러움 0.11%(2명/1,866명), 두통 0.05%(1명/1,866명)의 순이었습니다.

중대한 유해사례는 약과의 인과관계에 상관없이 압박 골절 및 폐렴 각 0.05%(1명/1,866례, 1명)이며, 예상치 못한 유해사례는 약과의 인과관계에 상관 없이 구내염, 가래 이상, 후비루, 호흡곤란, 착각각, 고혈압, 압박 골절, 폐렴이 각 1건씩 보고되었습니다.

나. 재심사 기간동안 자발적인 보고, 임상시험 및 문헌정보등을 통해 보고된 예상치 못한 약물유해반응으로 근육통 2건, 동공확대 1건, 여드름 1건, 고혈당 1건, 두드러기 1건, 복부팽만 1건, 체중증가 1건으로 총 8건이 보고되었습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 복용 후 졸림, 피로, 무력증이 나타날 수 있으므로 운전이나 기계조작같이 기민함을 요구하는 작업을 행할 경우 좀더 주의를 기울여야 합니다.
- 2) 기민함을 감소시키거나 중추신경계 작용을 추가로 떨어뜨릴 수 있으므로 이 약과 알코올, 항우울제와 같이 복용하는 것은 피해야 합니다.
- 3) 레보세티리진은 요저류의 위험을 증가시킬 수 있으므로 요저류의 선행요인(예: 척수장애, 전립선 비대)이 있는 환자에게 투여할 경우 주의해야 합니다.

5. 상호작용

- 1) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않습니다.
- 2) 라세미체(광학이성질체)인 세티리진의 경우에는 알코올의 영향을 증가시키지 않을 것으로 보이지만 (0.5 g/L 혈액 수준), 레보세티리진과 알코올 또는 기타 CNS 억제제를 병용투여하는 경우 경계심이 추가로 감소될 수 있고 수행장애를 야기할 수 있습니다.
- 3) 레보세티리진과의 상호작용을 분석한 연구는 없지만 이성체인 세티리진과의 상호작용을 분석한 연구가 있는데 안티피린, 슈도에페드린, 에리스로 마이신, 아지스로마이신, 케토코나졸, 시메티딘 과는 상호작용이 없었습니다. 테오필린(1일 400mg) 과의 다용량 시험에서는 세티리진 클리어런스가 경미한(16%) 감소를 보였습니다.
- 4) 리토나비어는 세티리진의 반감기 증가(53%) 및 클리어런스 감소(29%)와 함께 혈장 AUC를 42% 까지 증가시켰습니다. 리토나비어의 약물동태는 세티리진과의 병용투여로 인해 약간 변화(11% 감소) 되었습니다.
- 5) 음식과 같이 복용시 흡수 속도는 떨어지지만 흡수되는 총량은 감소하지 않습니다.

6. 임부 및 수유부, 가임여성에 대한 투여

- 1) 동물 실험결과 기형발생이 보고 된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않습니다.
- 2) 이 약 성분의 이성체인 세티리진이 모유를 통해 분비되기 때문에 이 약 성분도 모유 중에 분비될 가능성이 있으므로 수유 중에는 투여를 금하여야

합니다.

- 3) 이 약은 수태능에 미치는 영향에 관한 동물실험은 실시되지 않았습니다.

7. 소아에 대한 투여

- 1) 12세 미만 소아에서의 권장용량은 성인 및 소아 환자에서 이 약의 전신 노출 정도와 안전성 프로파일을 비교하여 설정되었습니다.
- 2) 1세 미만의 영아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않습니다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에서는 혈중 농도가 상대적으로 지속될 수 있으므로 사용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 합니다.

9. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르겐 피내반응을 억제하므로 알레르겐 피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투약하지 않는 것이 바람직합니다.

10. 과량투여시의 처치

- 1) 성인은 과량투여시 졸림이 나타나고 소아의 경우 초조와 안절 부절이 선행된 후 졸림이 나타납니다.
- 2) 이 약에 대한 특별한 해독제가 없으므로 과량투여 시 대증요법 또는 지지요법을 실시합니다. 단기간 과량투여 시 위 세척을 실시합니다.
- 3) 이 약은 혈액투석에 의해 효과적으로 제거되지 않습니다.

저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위 : 100mL

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2015년 7월 31일자로 작성되었으며, 이후로 변경된 내용을 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 :

한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조외주자 :

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우로27길 2

공장: 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)