

모사원 정 5밀리그램

(모사프리드시트르산염수화물)

전문의약품

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(135mg) 중

•유효성분 : 모사프리드시트르산염수화물(KP) 5.29mg(모사프리드시트르산염무수물로서 5mg)

•첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사육부위 : 우유)

•기타 첨가제 : 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 저지환도하드록시프로필셀룰로오스, 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 오프라다이하이트(03B28796)

[성 성] 분할선을 가진 흰색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과] 기능성소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)

[용법·용량] 성인 : 모사프리드시트르산염무수물로서 1일 15 mg을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

998례 중 40례(4.0%)에서 이상반응이 나타났다. 주요한 이상반응으로는 설사· 묽은 변(1.8%), 구갈(0.5%), 권태감(0.3%) 등이 있다.

임상검사치에서는 792례 중 30례(3.8%)에서 이상변동이 보였다. 주요 내용으로는 호산구증가(1.1%), 중성지방의 상승(1.0%), AST, ALT, ALP 및 γ -GTP의 상승(각 0.4%) 등이 있다.

1) 중대한 이상반응

전격성간염, 간기능 장애와 황달(각 0.1%미만) : 전격성간염, 현저한 AST, ALT, γ -GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능 장애, 황달이 나타나는 경우가 있고, 사망에 이른 예도 있으므로, 충분히 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.

2) 기타 이상반응

(1) 과민반응 : 발진, 두드러기, 때때로 부종

(2) 혈액계 : 때때로 호산구증가, 백혈구감소

(3) 소화기계 : 복부팽만감, 구갈마비(혀와 입술을 포함), 때때로 설사, 묽은 변, 구갈, 복통, 구역, 구토, 미각이상

(4) 간장 : 때때로 ALP의 상승, 빌리루빈상승, ALT 상승, 드물게 AST, γ -GTP의 상승

(5) 순환기계 : 때때로 심계항진

(6) 청신장장애 : 때때로 어지러움, 화청거림, 두통

(7) 기타 : 진전, 때때로 권태감, 중성지방의 상승

3) 국내 시판후 조사결과

국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 745명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응의 발현종류율은 인과관계 여부와 상관없이 1.9%(14례/745례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.3%(10례/745례)이다. 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 복통, 설사 각 4례, 묽은 변 3례, 구역 2례, 복부팽만, 소화불량, 유출분비과다, 권태, 발진 각 1례로 나타났다. 이 중 시판전 임상 시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 유출 분비과다가 각 1례씩 보고되었다.

4) 외국에서의 시판후 조사결과

일본에서 실시한 시판후 사용성적조사결과 3,014례 중 74례(2.5%)에서 이상반응이 나타났다. 주요한 이상반응으로는 설사· 묽은 변(0.8%), 복통(0.4%), 구갈(0.3%) 등이 있다.

5) 국내 지발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

• 출혈

3. 일반적 주의

일정기간(보통 2주) 투여하여도 소화기 증상의 개선이 보이지 않을 경우 장기간 투여하지 않는다.

4. 상호작용

이 약의 소화관운동촉진작용은 콜린자동성 신경과의 관련성으로 인해 콜린제(황산아트로핀, 부틸스코폴라민브롬화물 등)와 병용 투여시 이 약의 작용이 감소할 수 있으므로 복용 간격을 두는 등 병용시 주의한다.

5. 임부 및 수유에 대한 투여

1) 임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 동물실험에서 모유 중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유 중에는 투여를 피하고, 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

6. 소아에 대한 투여

소아 등에 대한 안전성이 확립되어있지 않다.(사용경험이 없다.)

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발현된 경우에는 감량(예, 1일 7.5 mg)하는 등 적절한 처치를 한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

9. 기타

설치류에 임상용량(100~300mg(30~100 mg/kg/일))을 장기간 경구투여한 시험(랫트 104주, 마우스 92주)에 있어 종양(간세포종종 및 갑상선여포상종종) 발생률의 상승이 나타났다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[표장단위] 30정/병, 100정/병, 500정/병

제조사
에이치케이이노엔주식회사
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239
고객상담센터:080-700-8802
<http://www.inno-n.com>

FD-080528
LD-200327

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

• 이 첨부문서 작성일자(2020년 03월 27일)이후 변경된 내용은 <http://www.inno-n.com> 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) ▶ 의약품정보에서 확인할 수 있습니다.

• 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>) ▶ 의약품 부작용 피해구제, 대표전화: 1644-6223)에 할 수 있습니다.

• 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타나 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>) ▶ 의약품 이상사례 보고)에 알리도록 하십시오.

• 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요. • 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

• 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요. • 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

631041111