

뇌기능 개선제

엘카린 정

분류번호 : 219

염산아세틸-L-카르니틴

전문의약품

【성분·함량】 1정 중

아세틸-L-카르니틴염산염(KPC) 590mg
(아세틸-L-카르니틴염으로서 500mg)

【성상】

백색의 장방형의 제피정

【효능·효과】

일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

【용법·용량】

아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500mg을 1일 2~3회 경구투여하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자에는 투여하지 마십시오.
2. 이상반응 : 이 약의 복용시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약 용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실됩니다.
3. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있습니다.
3. 임부 및 수유부 등에 대한 투여
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용하십시오.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

60정

- 제조자 : 구주제약주식회사 / 경기도 화성시 정남면 덕절제기길 5
- 제조의뢰자 : 삼익제약주식회사
- * 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 이 문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품 의약품안전청에 알리도록 하십시오.
- * 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 이 문서 작성일자(2013년 1월 22일)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청천1동 374-1
학술/개발부 : (02)928-0661