

뇌기능 개선제

# 카니틸<sup>®</sup>산

(아세틸-L-카르니틴염산염)

전문의약품

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 의약품<br>분류번호 | 219<br>기타의 순환계용약 |
|-------------|------------------|

## 【원료약품의 분량】 1포(1.5g) 중

아세틸-L-카르니틴염산염(KPC) ..... 590mg  
(아세틸-L-카르니틴염으로서 500mg)

## 【성상】 하양색의 분말

## 【효능·효과】

일차적 퇴행성 질환

뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

## 【용법·용량】

1회 1포, 1일 2~3회 복용

## 【사용상의 주의사항】

1. 금기 : 이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자에는 투여하지 말 것.
2. 부작용 : 이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.
3. 임부예의 투여 : 동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사의 감독 하에서 복용할 것
4. 다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.

## 【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

## 【포장단위】 자사포장단위

## 【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.  
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

## ※ 주의

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
3. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
4. 흡습성이 우려되므로 개봉한 제품은 즉시 복용하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2010. 10. 20.

제조업자:

**Hanmi** 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 뱃지동 45

(공정)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

제조자: 한미약품(주) 경기도 화성시 향남읍 상신리 906-1

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는  
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.