

리치몬 정 35밀리그램

(리세드론산나트륨)

분류번호 : 399

전문의약품

●원료약품 및 그 분량
이 약 1정(247mg) 중
주성분 : 리세드론산나트륨 (USP) 35mg

●성상
얇은 오렌지색의 장방형 필름코팅정제

●효능·효과
폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방, 남성의 골다공증 치료

●용법·용량
1. 성인: 35mg 정제를 매주 1회 경구 투여
2. 고령자: 고령자(60세 이상)에서 이 약의 생체 이용률과 약동력은 젊은 사람들과 유사하기 때문에 용량을 조절할 필요가 없다.
3. 소아: 소아와 성장기 청소년에 대한 안전성과 유효성은 확립되지 않았다.
4. 신장애환자: 크레아티닌 청소율(creatinine clearance)이 30mL/min 이상인 환자는 용량을 조절할 필요가 없다. 크레아티닌 청소율(creatinine clearance)이 30mL/min 미만인 심한 신장애 환자에서는 금기이다.

음식물은 이 약의 흡수를 방해하기 때문에, 충분한 흡수를 위해 다음과 같이 복용한다.

아침식사 최소 30분 전에 복용하거나 또는 하루 중에 어떤 때라도 음식물이나 음료수의 섭취 전후로 최소 2시간 떨어져서 복용한다.

이 약을 위(stomach)로 쉽게 도달시키고 식도 자극 가능성을 감소시키기 위해, 똑바른 자세(upright position)로 충분한 양의 순수한 물(170 ~ 230ml)과 함께 복용한다. 평천수를 포함한 다른 음료수와 함께 복용시 이 약의 흡수를 저하시킬 수 있다.

이 약은 구강인두의 궤양화 가능성 때문에 씹거나 빨아먹어서는 안 된다. 그리고 환자는 복용 후 최소 30분 동안 눕지 말아야 한다.

환자가 정해진 복용일에 복용하는 것을 잊어버린 경우 기억한 그 다음날 아침에 복용하도록 한다. 그 다음 복용은 기존에 정해진 복용일에 다시 복용하도록 한다. 같은 날 2정을 복용해서는 안 된다.

●사용상의 주의사항

1.경고

이 약은 다른 비스포스포네이트 제제와 마찬가지로 상부 위장관 점막에 국소자극을 일으킬 수 있다. 경구용 비스포스포네이트를 투여받은 환자에서 때때로 출혈과 함께 식도염, 식도궤양, 식도마라와 같은 식도 이상반응이 보고된 바 있으며, 드물게 식도폐색 또는 천공으로 발전하였다. 일부 환자에서는 증상이 심하여 입원을 요하는 경우도 있었다. 그러므로 의사는 식도 반응의 조짐을 보이는 모든 증상 및 증후에 대해 주의를 기울여야 하며, 환자에게 연하곤란, 연하통 또는 흉골후방의 통증, 속쓰림의 발생 또는 악화과 같은 증상이 있을 경우 복용을 중지시키고 의사와 상의하도록 지시해야 한다. 이 약을 복용한 후 누워 있거나, 이 약을 충분한 양의 물(170 ~ 230ml)과 함께 복용하지 않았거나, 식도 자극의 증상이 나타난 후에도 계속해서 이 약을 복용한 환자에서 심각한 식도 이상반응의 위험은 훨씬 커진다. 그러므로 용법·용량을 환자에게 잘 설명하고 이해시키는 것이 매우 중요하다(용법·용량 참조). 정신적 장애로 지시된 공범을 따르지 못하는 환자에 대한 이 약의 치료는 적절한 지도감독 하에 이루어져야 한다. 경구용 비스포스포네이트는 상부 위장관 점막을 자극시킬 수 있으므로 연하곤란, 식도질환, 위염, 십이지장염 또는 궤양과 같은 상부 위장관 질환이 있는 환자에게 투여할 경우 주의해야 한다. 외국의 시판 후 조사에서 경구용 비스포스포네이트 투여 시 일부 중증의 합병증을 수반한 위궤양 및 십이지장 궤양이 발생한 사례가 보고된 바 있다. 대조임상시험에서는 이러한 위험성의 증가가 확인되지 않았다.

2.다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 식도혈착 또는 무이완증과 같이 식도 배출을 지연시키는 식도이상 환자
- 2) 이 약에 과민반응을 보이는 환자
- 3) 저칼슘혈증 환자
- 4) 30분 이상 똑바로 앉거나 설수 없는 환자
- 5) 임부 및 수유부
- 6) 중증 신장애 환자 (크레아티닌 청소율이 30mL/min미만인 자)
- 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

3.이상반응

1) 임상시험에서 나타난 이 약을 투여한 군에서는 이상반응은 위약군과 유사하였다. 대부분의 이상반응은 경증 또는 중등도였고, 이로 인해 치료를 중단한 환자는 없었다. 중증의 이상반응을 나타난 환자는 위약군에서 24.9%로 이 약을 투여한 환자(26.3%)와 유사하였다. 이상반응으로 인해 시험을 중단한 환자는 위약군과 이 약을 투여한 환자에서 각각 14.4%, 13.5%였다. 2% 이상의 빈도를 나타내고 이약을 투여한 군에서 위약군보다 빈번하게 나타난 이상반응은 아래와 같다.

골다공증에 대한 3상 임상시험에서 위약과 비교시 리세드론산나트륨 5mg 투여군에서 보다 빈번하게 나타나는 이상반응 발현율 (2% 이상)					
전신계	위약 % (1914명)	리세드론산나트륨 5mg 투여군 % (1916명)	전신계	위약 % (1914명)	리세드론산나트륨 5mg 투여군 % (1916명)
전신계			골이상	3.2	4.0
감염	29.7	29.9	다리경련	2.6	3.5
요통	23.6	26.1	활액낭염	2.9	3.0
관통통	13.1	13.6	건이염	2.5	3.0
부종	9.4	11.6			
모두의 통증	4.5	5.3	신경계		
무력감	4.3	5.1	우울증	6.2	6.8
홍통	4.9	5.0	편두통	5.4	6.4
신경통	3.0	3.3	불면증	4.5	4.7
허나아	2.5	2.9	불안감	3.0	4.3
			신경통	3.5	3.8
심혈관계			현훈	3.2	3.3
고혈압	9.0	10.0	긴장형진	2.1	2.2
심혈관계질환	1.7	2.5	감각이상	1.8	2.1
협심증	2.4	2.5			
소화기계			호흡기계		
오심	10.7	10.9	인두염	5.0	5.8
설사	9.6	10.6	비염	5.0	5.7
고창	4.2	4.6	호흡기관	3.2	3.8
위염	2.3	2.5	폐렴	2.6	3.1
위장관계질환	2.1	2.3			
직장질환	1.9	2.2	피부 및 부속기계		
치과질환	2.0	2.1	발진	7.2	7.7
			가려움증	2.2	3.0
혈액·림프계			피부염	1.8	2.0
빈상증	4.0	4.3	특수감각계		
빈혈	1.9	2.4	백내장	5.4	5.9
			결막염	2.8	3.1
근골격계			중이염	2.4	2.5
관절통	21.1	23.7			
관절 이상	5.4	6.8	비뇨생식기계		
근육통	6.3	6.6	요로감염	9.7	10.9
골절증	4.3	4.6	방광염	3.5	4.1

때때로 (0.1~1%) 심이지장염과 설염이 나타났다. 드물게(0.1%) 비정상적인 간 기능 검사 결과가 보고되었다.

임상검사 수치는 무증후群(asymptomatic)의 혈중 칼슘과 인의 농도가 약간 감소하였다. 이 약을 6개월 동안 투여 받은 환자에서 혈중 칼슘농도는 평균 0.8%, 혈중 인농도는 평균 2.7% 감소하였다. 이 약을 투여받은 군과 위약군 모두에게 9명(0.5%)씩 모두 18명에서 혈중 인농도가 8mg/dl이하로 나타났다. 혈중 인 농도 2mg/dl이하로 나타난 환자는 14명으로 이 약을 투여받은 환자에게 11명(0.6%), 위약군 환자에게 3명(0.2%)이었다.

내시경 소견에서 임상시험에서 참여한 환자의 상당수가 이미 위장관 질환을 앓고 있으며, 비스테로이드성 소염제나 아스피린을 병용투여하고 있었다. 시험자는 중증도 또는 중증의 위장관 질환을 호소하는 환자에 대하여 내시경 검사를 실시하였으며 이 약을 투여 받은 군과 위약군 동일한 수(각 75명, 11.9%)에 대하여 검사시 이루어졌다. 내시경검사에서도 식도 위, 십이지장 점막이 정상으로 나타난 경우에는 위약군 20%, 이 약을 투여 받은 군 21%로서 유사하였다. 시험을 중단한 환자와 내시경 검사에서 이상 소견을 나타낸 환자는 이 약을 투여받은 군과 위약군에서 유사하게 나타났다. 경증의 심이지장염을 나타낸 환자는 이 약을 투여 받은 군에서 많았으나 심이지장궤양을 나타낸 환자의 수는 위약군에서 더 많았다. 이러한 증상을 나타내는 환자 중 임상적으로 중요한 중추(천공, 궤양, 출혈)을 나타내는 환자의 수는 두 군 간에 서로 유사하다(대조군 51%, 이 약을 투여한 군 39%).

- 2) 폐경기 여성을 대상으로 리세드론산나트륨 5mg 1회 1회 투여와 리세드론산나트륨 35mg 1주 1회 투여를 비교한 1년 동안의 이중맹검, 다기관 임상시험에서, 두 투여용법의 전반적인 안전성 및 내약성 양상은 유사하게 관찰되었다. 본 임상시험 중 환자의 2% 이상에서 발현된 이상반응은 아래와 같다. 이상반응은 약물과의 인과관계와 관계없이 기재하였다.

1일 1회 투여와 주1회 투여를 비교한 임상시험에서 2% 이상의 환자에서 발현된 이상반응					
전신계	리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군 % (480명)	리세드론산나트륨 35mg 1주 1회 투여군 % (485명)	전신계	리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군 % (480명)	리세드론산나트륨 35mg 1주 1회 투여군 % (485명)
전신계			말초성 부종	4.2	1.6
감염	19.0	20.6	근골격계		
사교로 인한 상해	10.6	10.7	관절통	11.5	14.2
통증	7.7	9.9	외상성 골절	5.0	6.4
요통	9.2	8.7	근통(근육류마티즘)	4.6	6.2
유형성감기중후군	7.1	8.5	관절염	4.8	4.1
부종	7.3	7.6	혈액난류	1.3	2.5
두통	7.3	7.2	골통증	2.9	1.4
괴상투여	6.9	6.8			
무력감	3.5	5.4	신경계		
홍통	2.3	2.7	헌기증	5.8	4.9
일대르기 반응	1.9	2.5	불안증	0.6	2.7
중양	0.8	2.1	우울증	2.3	2.3
목부위 통증	2.7	1.2	현훈	2.1	1.6
심혈관계			호흡기계		
고혈압	5.8	4.9	기관지염	2.3	4.9
심신	0.6	2.1	부비강염	4.6	4.5
혈관확장	2.3	1.4	인두염	4.6	2.9
소화기계			가슴중가	3.1	2.5
변비	12.5	12.2	폐렴	0.8	2.5
소화불량	6.9	7.6	비염	2.3	2.1
구역	8.5	6.2			
설사	6.3	4.9	피부 및 부속기계		
위장관염	3.8	3.5	발진	3.1	4.1
고창	3.3	3.1	가려움증	1.9	2.3
대장염	0.8	2.5	특수감각계		
위장관 질환	1.9	2.5	백내장	2.9	1.9
구토	1.9	2.5			
구갈	2.5	1.4	비뇨생식기계		
대상·영양관련 질환			요로감염	2.9	5.2

- 3) 폐경기 여성을 대상으로 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여와 리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여를 비교한 1년 동안의 이중맹검, 다기관 임상시험에서, 두 투여용법의 전반적인 안전성 및 내약성 양상은 유사하게 관찰되었다. 본 임상시험 중 환자의 2% 이상에서 발현된 이상반응은 아래와 같다. 이상반응은 약물과의 인과관계와 관계없이 기재하였다.

1일 1회 투여와 월 1회 투여를 비교한 임상시험에서 2% 이상의 환자에서 발현된 이상반응					
신체기관별 분류	리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군 % (642명)	리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군 % (650명)	신체기관별 분류	리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군 % (642명)	리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군 % (650명)
소화기계			사지통증	2.6	2.8
상복부통	6.1	8.2	근경직	1.2	2.6
설사	4.7	8.2	근육통	1.1	2.0
구역	6.9	6.2	경부통증	2.0	1.7
변비	7.3	5.8			
소화불량	4.4	5.1	전신계		
구토	3.6	4.5	무력증	2.2	3.1
복통	3.3	3.5	홍통	1.2	2.0
위장가스	2.6	2.3	발열	0.8	2.0
위염	1.9	2.3	넘어짐	3.3	4.6
복부팽만감	2.0	2.2			
탈중탈장	2.3	0.8	신경계		
구강건조	2.0	0.3	두통	4.8	4.5
			어지럼증	1.9	2.0
감염					
인플루엔자	4.2	8.9	심혈관계		
비인두염	6.2	5.8	고혈압	4.8	4.6
요로감염	3.6	5.7			
기관지염	4.4	3.1	호흡기계		
위장관염	2.2	2.8	기침	1.2	2.3
상기도염	1.2	2.0			
방광염	2.0	0.9	정신신경계		
			우울증	1.2	2.0
근골격계					
요통	6.4	5.7	대상 및 영양이상		
관절통	7.3	5.5	고콜레스테롤혈증	0.8	2.2
골관절염	3.0	3.7			

약을 투여한 첫 3일 이내에 발열 또는 인플루엔자 유사증상이 나타나 7일 이내로 지속되는 급성기 반응 양 증상은 리세드론산나트륨 150 mg 월 1회 투여군에서 1.4%, 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군에서는 0.2%에서 보고되었다. 리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군에 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군보다 설사로 인한 투약 중단률이 다소 높았으며 (각각 0.8%, 0.0%), 이러한 소화기계 이상반응은 대부분 투여 첫 1일 이내에 발생하였다. 구토 증상으로 인한 투약 중단은 두 군에서 동일한 수준으로 나타났다(각각 0.3%, 0.3%).

리세드론산나트륨 150mg 투여군에서 포도막염, 공막염, 홍채염과 같은 눈의 염증을 경험한 환자는 없었으나, 리세드론산나트륨 5mg에서는 두 명의 환자에서 홍채염이 나타났다.

실험실 검사 결과, 리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군과 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군에서 12개월 후의 혈중 칼슘은 각각 0.3%, 0.1% 증가하였고, 인산염은 2.3%씩 감소하였으며, PTIN는 각각 4.8%, 8.3% 증가하였다. 또한 투여 후 첫 1개월이 지난 시점에서 리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군에 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군에서보다 저칼슘혈증 발생률이 약간 높게 나타났으나 (각각 2.2%, 0.2%), 이후의 저칼슘혈증의 발생률은 두 투여군에서 유사하였다 (약 2%).

4) 남성의 골다공증

285명의 남성 골다공증환자를 대상으로 한 위약대조임상시험 결과에서 골밀도는 증가시켰으나 골절 발생 빈도에는 유의한 차이가 없었다. 전반적인 안전성 및 유효성은 폐경 후 여성의 골다공증 임상시험에서 보고된 이상반응과 유사하였다. 추가로 양성전립선비대(리세드론산나트륨 35mg군 5%, 위약군 3%), 신석증(각각 3%, 0%), 부정맥(각각 2%, 0%) 이었다.

5) 외과 시판 후 조사

스티븐스-존슨증후군(피부점막만종후군), 독성 표피 괴사증후군을 포함하는 중증의 피부반응, 혈관부종, 발진, 물집을 포함하는 과민반응, 피부반응 등이 매우 드물게 보고되었다. 식도염, 식도궤양 및 위궤양과 같은 상부 위장관 이상이 보고되었다. 근육경직에서 골통증, 관절통, 근육통이 드물게 보고되었다. 홍채염과 포도막염을 포함한 눈의 염증과 턱뼈괴사가 매우 드물게 보고되었다. AST(Aspartate aminotransferase), ALT(Alanine aminotransferase), 감마 GTP (gamma-glutamyl transpeptidase)의 현저한 상승을 수반하는 간기능 장애, 황달이 보고되었다(빈도불명).

6) 국내 시판 후 조사

국내에서 6년동안 933명을 대상으로 실시한 시판 후 사용안전성조사결과 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 18.86%(176/933명, 320건)로 보고되었다. 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해사례는 6.65%(62명/933명, 85건)으로 소화불량 1.71%(16명/933명, 17건), 식욕부진 0.64%(6명/933명, 6건), 오심 0.64%(6명/933명, 6건), 근육통 0.54%(5명/933명, 5건), 복통 0.43%(4명/933명, 4건), 무력증 0.43%(4명/933명, 4건), 가슴쓰림 0.32%(3명/933명, 3건), 명치 통증 0.32%(3명/933명, 4건) 등의 순으로 보고되었다. 예상하지 못한 약물유해사례는 1.29% (12명/933명, 15건)으로 식욕부진 0.64% (6명/933명, 6건), 가슴불쾌, 두근거림, 발한 증가, 안면홍조, 작열감, 신장결석, 트림, 혈뇨, 열이 각각 0.11% (1명/933명, 1건)이었다.

4. 일반적 주의

1) 일반사항

- (1) 비스포스포네이트 약물은 식도염 및 식도 궤양 형성과 연관이 있다. 따라서, 환자는 상기 용법용량에 주의를 기울여야 한다. 또한 의사 및 약사는 식도 질환의 병력이 있는 환자에게 복용법의 중요성을 강조하여야 한다.
- (2) 이 약의 투여 전에 저칼슘혈증과 여타의 뼈 및 무기질 대사 장애(예, 부갑상선 기능부전, 비타닌 D 결핍증)를 반드시 치료해야 한다. 모든 환자에서 적절한 양의 칼슘과 비타민 D를 섭취하는 것이 중요하다.
- (3) 경구용 비스포스포네이트제제 투여시 국소적 턱뼈괴사가 드물게 보고되었다. 이 증상은 일반적으로 발치 및/또는 치료가 지연된 국소감염(골수염 포함)과 연관성이 있었다(3. 이상반응 참조). 비스포스포네이트제제와 관련된 것으로 보고된 턱뼈괴사 사례의 대부분은 정맥주사용 비스포스포네이트제제를 임플란트에 투여시 나타났으나, 폐경 후 골다공증 환자에서도 일부 발생하였다. 암, 병용투여약물(예, 항암제, 항혈소판제, 방사선치료, 코르티코스테로이드) 불결한 구강위생, 동반질환(예, 치주질환 및/또는 기존에 있었던 치과질환, 빈혈, 응고병증, 감염) 및 흡연이 턱뼈괴사의 위험인자로 알려져 있다. 턱뼈괴사가 나타난 환자는 구강외과의사의 적절한 치료를 받아야 한다. 치과적 수술은 상황을 악화시킬 수 있다. 치과 처치를 필요로 하는 환자에 있어서, 비스포스포네이트 치료의 중단이 턱뼈괴사에 대한 위험을 줄일 수 있음을 보여주는 유용한 자료는 없다. 치료 주치의의 임상적 판단으로 각각의 환자에 대한 관리 계획을 개별적 유익성/위험성 평가에 근거하여 세워야 한다.
- (4) 시판후 사용감염에서 비스포스포네이트를 투여받은 환자에서 중증이고 때때로 무력적인 골, 관절, 및/또는 근육의 통증이 드물게 보고되었다. 비스포스포네이트 약물은 이 약도 포함된다. 증상 발현까지의 시간은 치료 개시후 1일부터 몇 개월까지 다양하였다. 대부분의 환자는 치료 중단후 증상이 경감되었다. 이 환자들 중 일부에서는 동일한 또는 다른 비스포스포네이트를 재투여했을 때 증상이 재발하였다.

2) 환자에게 제공되어야 할 정보

- (1) 다가 양이온(칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등)을 함유한 약물, 식품, 순수한 물 이외의 음료수는 이 약의 흡수를 방해할 수 있기 때문에 동시에 투여하지 말아야 한다. 따라서 이 약의 입증된 유익성을 얻기 위해서는 하루 중에 처음으로 음식물을 섭취하기 적어도 30분전 또는 음식물 섭취로부터 적어도 2시간이후 떨어진 시점에서 이 약을 투여하여야 한다.
- (2) 약물을 위로 신속히 도달시켜 식도 자극의 가능성을 줄이기 위하여 환자는 반드시 이 약을 충분한 양의 물(170~230 mL)과 함께 삼키고, 복용 후에는 최소한 30분간 그리고 그날의 최초 음식물 섭취 후까지 누워서는 안된다.
- (3) 이 약은 구강인자의 궤양과 기능성 때문에 씹거나 빨아먹어서는 안 된다. 환자는 특히 이 약을 취침전이나 기상 전에 복용하지 않도록 해야 한다. 이러한 사항을 준수하지 않았을 경우 식도장애의 위험이 증가한다는 것을 환자에게 반드시 알려야 한다. 환자에게 만약 식도질환 증상(음식물을 삼키기 어렵거나 아픔, 복통, 흉골후방의 통증, 가슴앓이가 생기거나 심해졌을 때)이 나타나면 반드시 이 약의 복용을 중지하고 의사와 상의하도록 지시해야 한다.
- (4) 의사는 음식물로부터의 섭취가 불충분할 경우에 보조요법으로 칼슘 및 비타닌 D를 투여하는 것을 고려해야 한다. 특히, 장기적으로 전신적인 부신피질 호르몬치로(systemic corticosteroid treatment)를 받는 남녀 환자는 적절한 양의 칼슘과 비타닌 D를 복용해야 한다.
- (5) 체중부하 운동은 과도한 흡연, 음주와 같은 특정 습관 요인의 변화와 더불어 고려되어야 한다.
- (6) 의사는 반드시 이 약 치료 전 환자에게 제품설명서를 읽도록 하고 새로운 처방을 내릴 때마다 다시 읽도록 지시해야 한다.

5. 상호작용

- (1) 이 약은 별도의 약물 상호작용 연구는 수행되지 않았다. 폐경 후 골다공증 치료를 위한 제3상 임상 시험에 참여한 여성의 31%가 아스피린을, 48%가 비스테로이드성 소염진통제를, 21%가 H2 길항제 및/또는 프로톤펌프 억제제를 복용했다. 일주일에 3일 이상 정기적으로 아스피린 또는 비스테로이드성 소염진통제를 복용한 환자들에서 나타난 상부 위장관 이상반응 발현은 시험군과 대조군에서 비슷했고, H2 길항제 및/또는 프로톤펌프 억제제를 복용한 환자들에서도 유사한 결과로 관찰되었다.
- (2) 필요하다면 호르몬 대체 요법과 병용할 수 있다.
- (3) 칼슘보충제, 제산제 및 다가 양이온(칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등)을 함유한 경구투여 약물의 병용 투여는 이 약의 흡수를 방해한다.
- (4) 이 약은 전신적으로 대사되지 않으며, 사이토크롬 P-450 효소를 유도하거나 억제하지 않는다. 인체 혈장내 단백질 결합률은 약 24%이며, 동물 실험 결과 약 60%가 뼈에 분포하였다. 나머지는 대사되지 않은 상태로 신장 배설된다.

6. 임부와 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에 대한 연구는 없었으나, 동물시험에서 분만기 모체 저칼슘혈증과 태자의 골화 효과가 일어날 수 있음이 보고되었다.
- 2) 이 약이 수유부에게 미치는 중요성을 고려하여 이 약의 투여를 중지하거나 수유를 중단하여야 한다.
- 3) 젖트에 이 약 16mg/kg/day(체표면적당 용량(mg/m²))으로 환산시 인체 투여용량인 30mg/day의 약 5.2배) 이상을 임신기간 동안 투여하였을 때 생종출산자수가 감소하였고, 홍홍분질의 비골화 및 불완전 골화가 증가하였다. 또한 80mg/kg/day로 투여하였을 때 출산자 체중이 감소하였으며, 7.1mg/kg/day로 투여한 경우에는 홍홍분질 및 두개골의 불안전 골화가 나타난 태자의 수가 통계적으로 유의하게 증가하였다. 3.2mg/kg/day 이상으로 투여하여 분만한 태자에서, 낮은 발생률로 구개열이 관찰되었다.
토끼에게 임신기간 동안 10mg/kg/day까지 투여하였을 때 유의한 태자의 골화효과는 발생되지 않았으나, 10mg/kg/day에서 14마리 새끼 중 1마리는 유산되었고, 1마리는 조산되었다. 다른 비스포스포네이트 제제와 유사하게, 랫트에 3.2mg/kg/day(인체 투여용량의 1배)로 교배기간 및 임신기간 동안 투여한 경우 모체의 보만전후 저칼슘혈증 및 사망이 관찰되었다.
이 약물은 약물투여 후 24시간 이내에 수유중인 랫트에서 검출되며 유즙을 통해 분비된다.

7. 소아에 대한 투여

소아에서의 안전성과 유효성은 확립되지 않았다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자와 젊은 환자 사이에 안전성과 유효성은 차이가 없다.

9. 과량 투여시의 처리

- 1) 일부 환자에서 상당량의 과량 투여로 인한 혈중 칼슘과 인의 감소를 예상할 수 있다. 이러한 환자에서 저칼슘혈증의 징후와 증상이 나타날 수 있다. 이 약의 흡수를 감소시키기 위해서는 우유나 칼슘을 함유하는 제산제를 투여하여야 한다.
- 2) 상당량이 과량 투여된 경우 흡수되지 않은 약물을 제거하기 위하여 위세척을 고려해볼 수 있다. 저칼슘혈증을 치료하는 데 효과적인 표준화된 방법들은 이온화 칼슘의 생리화학적 양을 회복시켜주고 저칼슘혈증의 징후와 증상을 감소시킨다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

● 저장방법:밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

● 포장단위:4정

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과 되었거나 변질·변태, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.



제조의뢰자:씨제이제일제당주식회사
경기도 화성시 봉담읍 와우리 221-100
고객행복센터:080-700-8802

제조사:한림제약주식회사
경기도 용인시 처인구 유방동 1007

- 이 첨부문서 작성일자(2010년 08월 03일)이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 에서 확인할 수 있습니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이ذ리드 → 보고마당 → 안전성보고) → 의약품유해사례보고에 알리도록 하십시오.
- 이지드(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)의약품 정보 참조
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관 하세요.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요.