

에판에스 정

【성분 · 함량】 (1정 중)

다이제스트100(KPC)	3.75mg
(알파아밀라제)	375유니트
(베타아밀라제)	45유니트
(프로테아제)	375유니트
탄산마그네슘(KP)	80.0mg
탄산수소나트륨(KP)	250.0mg
스코폴리아엑스10배산(KP)	75.0mg
(중 알카로이드로서)	0.075mg)
첨가제(타르색소) : 황색203호 AL-LAKE, 청색1호 AL-LAKE, 청색2호 AL-LAKE	

【성 상】 연초록색의 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

과식, 소화불량, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감, 식체(체함), 구역, 구토, 위통, 복통(배아픔), 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감

【용법 · 용량】

성인 및 만 15세 이상 : 1회 2정씩 1일 3회 식간(식사때와 식사때 사이에)에 복용하십시오.
 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 2정씩 1일 2회 복용하십시오.
 만 8세 이상 ~ 만 10세 미만 : 1회 1정씩 1일 3회 복용하십시오.
 ※ 복용간격을 4시간 이상으로 하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 수유부 (모유로 이행해서 젖먹이의 맥박이 빨라질수 있습니다.)
 - 2) 만 7세 이하의 어린이
 - 3) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

: 스코폴리아 엑스 함유 제제 및 다른 위장진통 · 진경제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타나는 사람
 - 2) 신장장애 환자
 - 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 6) 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨(소변을 눅)장애 환자, 허약자 또는 고령자(노인)
4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 경우
 - 3) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 4) 이 약을 복용함으로써 구갈(목마름), 변비의 증상이 나타날 수 있습니다. 또 두통, 안면(얼굴)홍조, 눈부심, 배뇨(소변을 눅)장애 등이 나타날 경우
- 5) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 - 3) 이 약을 복용함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
 - 4) 나트륨 제한 식이를 하는 사람
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28번지



설명서 작성년월일 : 2012.03.21