

흡수율이 좋은 철결핍성빈혈의 예방 및 치료

헤모로빈

연질캡슐

Hemolobin

[원료약품 및 분량] 1캡슐(1,440mg) 중


푸마르산철(KP)	200.00mg
(철로서 66mg)	
아스코르브산(KP)	250.00mg
폴산(KP)	1.00mg
시아노코발라민(KP)	0.01mg
첨가제(천연색소): 카카오색소, 치자청색소	

[성 상] 암적갈색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

철 결핍성 빈혈

[용법 · 용량] 성인 1일 1회 1캡슐을 복용하십시오.



본 제품은 어린이 보호용 안전
포장을 사용하고 있습니다.
복용시,

- ① 가위 등으로 절취선을 따라
자르십시오.
- ② 접착이 안된 화살표부분을
집고 화살표방향으로 파어
낸 후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
- 2) 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자
- 3) 비철결핍성 빈혈 (예 : 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 4) 악성빈혈(pernicious anemia) 환자 (폴산을 함유하고 있다.)
- 5) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용테트라사이클린계 제제
- 3) 탄산칼슘, 수산화마그네슘 등이 함유된 제산제(철분의 흡수를 저해(억제)한다.)
- 4) 알로푸리놀(헤모시데린침착증을 일으킬 수 있다.)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용중 또는 복용전후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 2) 과수산뇨증(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
- 3) 임부 및 수유부
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애(신장장애) 환자
- 7) 저단백혈증 환자

- 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것)
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 1) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 상복부불쾌감, 구역, 구토, 위통, 복통, 위경련, 설사, 변비
 - 2) 피부 : 때때로 소양감(가려움증)이 나타날 수 있으며 햇빛 노출시 피부 과민반응, 두드러기, 홍반(붉은반점), 피부발진, 가려움, 전신 등에서의 알레르기 증상
 - 3) 기타 : 때때로 심와부(명치부위) 동통(통증)이 나타날 수 있으며, 부종(부기), 체중감소, 열, 혼수
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 발생할 수 있다.
 - 5) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 이 약은 폴산을 함유하고 있어 악성빈혈환자에게 투여할 경우 혈액상태는 개선되지만 신경증상에는 효과가 없으므로 진단이 확립되지 않은 악성빈혈환자가 이 약을 복용할 경우 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 될 수 있으므로 주의할 것.
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 정해진 용법 : 용량을 잘 지킬 것.
 - 4) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 5) 임상검사치에의 영향 : 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 6) 아스코르브산(비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.
 - 7) 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못사용), 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【저장방법】 기밀용기, 15~30℃ 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자(2011년 01월)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실 : 031-260-9271

설명서 개정일 : 2011. 01

판매원 :

경기도 용인시 기흥구 보정동 303
 **녹십자**
 GREEN CROSS

제조원 :

경기도 화성시 향남읍 상신리 908-6
 **알앤피코리아(주)**