

# 비타코 플러스 연질캡슐

## 육체피로/허약체질/병중·병후의 체력저하시

비타민은 발육·성장, 질병예방, 건강유지 등의 각종 신체의 대사와 기능에 필수적인 것으로 미량으로도 유효한 화합물이나 체내에서 합성되지 않으므로 섭취를 통하여 보충해 주어야 합니다. 그러나 쌀을 주식으로 하는 식생활, 인스턴트식품, 편식과 다이어트 등으로 인해 식사만으로는 비타민을 충분히 섭취할 수 없습니다. 또한 격무와 스트레스에 시달리는 현대인은 비타민 소모가 많아 식사 이외의 비타민 공급원이 필요합니다. 또한 비타민은 각각의 고유한 생리활성을 가지므로 여러 비타민을 골고루 매일 복용해야 합니다.

비타코플러스 연질캡슐은 인체에 필요한 각종 비타민 6종을 고단위로 함유하는 종합비타민제로 격무와 스트레스에 시달리는 현대인의 육체피로, 청소년기의 허약체질, 만성질환환자의 체력 저하, 노년기의 식욕부진 및 임신·수유기의 비타민보급에 뛰어난 효과를 발휘합니다.

비타코플러스 연질캡슐은

1. 우리 몸에 꼭 필요한 비타민 6종을 함유하는 고단위 종합비타민제입니다.
2. 육체피로, 병중·병후의 체력저하시, 임신·수유기, 발육기 및 노년기의 비타민 보급에 뛰어납니다.
3. 연질캡슐 제형으로 불안정한 비타민의 안정성을 높입니다.
4. 1일 2캡슐 복용으로 간편합니다.

**[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,080mg)중**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 아스코르브산(KP) .....         | 50.00mg |
| 레티놀팔미테이트(KP) .....       | 1.471mg |
| (비타민A로서 2500IU)          |         |
| 콜레칼시페롤농축물(유상형)(BP) ..... | 0.40mg  |
| (비타민D로서 400IU)           |         |
| 리보플라빈(KP) .....          | 1.00mg  |
| 티아민염산염(KP) .....         | 1.00mg  |
| 니코틴아미드(KP) .....         | 20.00mg |

**[성상] 황색의 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐**

**[효능·효과]**

1. 다음 경우의 비타민A, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, C, D의 보급
  - 육체피로
  - 임신, 수유기
  - 병중·병후의 체력저하시
  - 발육기
  - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
  - 눈의 건조감 완화, 야맹증
  - 뼈, 이의 발육불량
  - 구루병의 예방

**[용법·용량] 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용**

**[사용상 주의사항]**

1. 경 고
  - 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
  - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
  - 3) 3개월 미만의 영아
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
  - 1) 1세 미만의 영아
  - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
  - 4) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria: 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
  - 5) 임부, 수유부
4. 이상반응
  - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
    - ① 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종
    - ② 설사, 묽은변

- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia: 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

#### 5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.

#### 6. 임부·수유부에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

- 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

#### 8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 뇨검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

#### 9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보존한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**【포장단위】** 1캡슐, 300캡슐

**【사용(유효)기간】** 제조일로부터 24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 해당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2009년6월)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://szdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실 : 02)568-0051 ■ 반품 및 교환처 : 02)569-5662

설명서 작성일 : 2009. 6

제 조 원 :



경기도 화성시 향남읍 향안리 908-6

알앰피코리아(주)