

에버칼정

EVERCAL Tab.

【원료약품의 분량】 1정중

탄산칼슘(USP) 1,250mg(칼슘으로서 500mg)
콜레칼시페롤농축분말(EP) 10mg(콜레칼시페롤로서 1,000IU)

【성상】 연한 자색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

· 다음 경우의 비타민 D의 보급 : -임신 · 수유기 -발육기 -노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. : · 비타민D (콜레칼시페롤농축분말) : · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
· 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】 성인 및 12세 이상의 어린이 : 1일 1회 1정을 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증 (sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자(비타민 D 또는 칼슘 함유제제)
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 3개월 미만의 젖먹이(미네랄 미함유 제제)
- 4) 만 12개월 미만의 젖먹이(미네랄 함유제제)
- 5) 신장결석 환자(칼슘 또는 비타민 D 함유제제)
- 6) 심한 증상의 신부전 환자(칼슘 또는 마그네슘 함유제제)
- 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제(미네랄 함유제제)

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이(어린이에 대한 용법이 있는 경우)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이(비타민 D 또는 칼슘 함유제제)(어린이에 대한 용법이 있는 경우)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아(비타민 A, C, D, E, 니코틴산, 아스파르트산, 요오드 함유제제)
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다(비타민 D함유제제).
- 5)심장 · 순환기계 기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자(비타민 D 함유제제)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상담할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 대량(많은 양)투여로 인해, 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있다(미네랄 함유제제).
- 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (칼슘함유제제).
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것(무기질 함유제제).
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것(어린이에 대한 용법이 있는 경우).
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것(미네랄 함유제제)

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여)보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【제조사】 콜마파마(주)(충북 제천시 바이오밸리2로 93)

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2014년 03월 11일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다
- ♣ 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

EVC2014.03.11-06

제조의뢰자 · 판매원
우리들제약

www.wooridulpharm.com

본사 · 공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211