

흡수율은 높고 위장장애가 적은

데시원 연질캡슐

덱시부프로펜 300 mg

【제품명】덱시위연질캡슐(덱시부프로펜)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 (975 mg) 중

• 유효성분 - 덱시부프로펜(KP) 300.00 mg

• 착색제(타르색소) : 황색5호, 청색1호

• 기타첨가제 : 폴리에틸렌글리콜600

소르비톨소르비탄액

【성상】 무색의 투명한 액이 든 연한 청록색의 투명한 달걀형 여질캡슐

【용법·용량】 성인: 덱사부프로펜으로서 1회 300 mg을 1일 2~4회 경구투여 한다. 단, 1일 덱사부프로펜으로서 1,200 mg을 초과하지 않는다.

【요약·효과】 1. 만성 대발성 관절염, 류마티스관절염 2. 관절증 3. 강직척추염 4. 외상 및 수술 후

통증서 보조 또는 여주 5. 여주, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 매일 3시간 이상 작업으로 술을 마시는 사람이 이보다 더한 해열제 복용량에 복용하여 경우 반신도 의사 또는 약사의 신중한 관리에, 이러한 사람은 이 약을 복용한 약을 유효할 수 있음, 2) 심혈관계 질환 : 이 약을 포함한 바스비로이드스 소염진통제는 이러한 심혈관계 질환 환자, 심근경색 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있음, 특히 기간에 대한 이러한 위험을 증가시킬 수 있음, 심혈관계 질환은 심혈관계 질환의 질병 및/또는 이 환자에서 더 위험할 수 있음, 3) 소화기 및 신장 : 이러한 심혈관계 질환의 병변에 대한 위험을 증가시키며 나타내어 주어 하며, 이는 심혈관계 질환의 병변이 있을 경우에도 더 위험하게 적용됨, 환자는 중대한 심혈관계 질환 및/또는 신장 및 신장 및 신장 장애에 대한 경증 경우 해당 치자에 대하여야 함에 대한 있어야 함, 4) 조영제 : 이는 고혈압, 울혈성 심부전(NYHA I-III), 환원된 하혈성 심장질환, 말초맥관질환, 뇌혈관질환을 가진 환자에게는 신중하게 고려하여 배수부전으로 사용되어야 하며, 고혈압 약물 프로판(일 1200 mg)은 신중하게 고려하여, 모든 심혈관계 질환을 가진 경우, 고혈압, 고혈압, 당뇨병, 울혈을 가지고 있는 환자 고혈압 고혈압(일 1200 mg) 및 혈관화 경증 장기간 치료를 시작하기 전에 신중하게 고려해야 함, 임상연구 결과 고혈압(일 2400 mg)이 부전된 나이에 동맥 혈관증상 심혈관계 질환에 노출됨에 대한 위험을 증가시키지 않았고 나이에 동맥 혈관증상 심혈관계 질환 결과 위험을 아무도 나타내지 않음, 1200 mg의 약물과 동맥 혈관증상의 위험을 증가시키는 연관성은 증명되지 않음, 배수부 전의 동맥 혈관 질환에 대한 장기 치환적 치환에 고혈압 약물 프로판(일 1200 mg)의 위험이 고혈압 아무도 부전(일 2400 mg)과 유사하며 가려짐의 것이 타당함, 3) 위장장애 : 이 약을 포함한 바스비로이드스 소염진통제는 위 또는 장의 위 출혈, 해당 위 전증을 포함한 중대한 위장장애에 이바지하는 위험을 증가시킬 수 있음, 이는 치명적일 수 있음, 이러한 이상현상은 특히 7시간 동안 경증 이상을 나타내며, 고령자는 중대한 위장장애에 이바지하는 위험이 더 높을 수 있음, 특히 7일이 24시간 중 증대한 위장장애에 이바지하는 위험이 가늠성이 높을 수 있음 단지 투여시 24시간 동안 위장장애에 이바지하는 위험이 가늠성이 높을 수 있음, 배수부 전의 위장장애에 이바지하는 위험이 완화된 배수부 전이 투여 중단하는 것이 바람직할 수 있음, 4) 신장 : 이 약을 투여하는 동안 위장장애 발생 또는 출혈의 증상을 감시하며 이에 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증의 위장장애에 이바지하는 의심되는 경우 즉시 투여중단 및/또는 치료를 시작하여야 하며, 바스비로이드스 소염진통제는 중증의 위장장애에 이바지하는 위험이 완화된 배수부 전이 투여 중단하는 것이 바람직할 수 있음, 5) 신장 : 이 약의 한자에는 바스비로이드스 소염진통제와 관련 없음 다른 대체 치료제를 고려하여야 함

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하지 말 것

1) 위장장애 2) 대변 이상 3) 소화 장애 4) 심한 불안 5) 심한 두통 6) 심한 피로 7) 심한 근육통 8) 심한 두통 9) 심한 불안 10) 심한 피로 11) 심한 근육통 12) 심한 두통 13) 심한 불안 14) 심한 피로 15) 심한 근육통 16) 심한 두통 17) 심한 불안 18) 심한 피로 19) 심한 근육통 20) 심한 두통 21) 심한 불안 22) 심한 피로 23) 심한 근육통 24) 심한 두통 25) 심한 불안 26) 심한 피로 27) 심한 근육통 28) 심한 두통 29) 심한 불안 30) 심한 피로 31) 심한 근육통 32) 심한 두통 33) 심한 불안 34) 심한 피로 35) 심한 근육통 36) 심한 두통 37) 심한 불안 38) 심한 피로 39) 심한 근육통 40) 심한 두통 41) 심한 불안 42) 심한 피로 43) 심한 근육통 44) 심한 두통 45) 심한 불안 46) 심한 피로 47) 심한 근육통 48) 심한 두통 49) 심한 불안 50) 심한 피로 51) 심한 근육통 52) 심한 두통 53) 심한 불안 54) 심한 피로 55) 심한 근육통 56) 심한 두통 57) 심한 불안 58) 심한 피로 59) 심한 근육통 60) 심한 두통 61) 심한 불안 62) 심한 피로 63) 심한 근육통 64) 심한 두통 65) 심한 불안 66) 심한 피로 67) 심한 근육통 68) 심한 두통 69) 심한 불안 70) 심한 피로 71) 심한 근육통 72) 심한 두통 73) 심한 불안 74) 심한 피로 75) 심한 근육통 76) 심한 두통 77) 심한 불안 78) 심한 피로 79) 심한 근육통 80) 심한 두통 81) 심한 불안 82) 심한 피로 83) 심한 근육통 84) 심한 두통 85) 심한 불안 86) 심한 피로 87) 심한 근육통 88) 심한 두통 89) 심한 불안 90) 심한 피로 91) 심한 근육통 92) 심한 두통 93) 심한 불안 94) 심한 피로 95) 심한 근육통 96) 심한 두통 97) 심한 불안 98) 심한 피로 99) 심한 근육통 100) 심한 두통

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

① 아스피린 (아스피린)의 병용은 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심각한 부작용의 위험을 감소시킬 수 있다는 증거가 있다. 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약의 아스피린의 병용에 의해 중독 위험 증가에 이차적인 영향이 있을 수 있으므로 두 약의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다. ② 아스피린과 병용하여 시 약 및 다른 비스테로이드성 소염진통제의 작용을 저하시킬 수 있다. ③ 다른 비스테로이드성 소염진통제와 병용하여 시 위장장애의 빈도가 증가할 수 있다. 이차적인 위장장애의 위험이

증가할 수 있으므로 병용투여하지 않는다. 3) 고용량(15 mg/주 이상)의 메토포렉세이트는 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 신세뇨관에서 메토포렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토포렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량의 메토포렉세이트는 병용투여하지 않는다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

1) 모우로의 이해에 의거하고, 이로 인해 영어에서 심각한 이상현상 발생 시, 우의 역을 복용하여 투어의 중요성을 고려하여 수고를 중단하거나 역물투어를 중단할 권리가 있다. 2) 의 역을 복용하여 이상현상은 어디로든 또는 피로가 나다를 수 있지만, 한자의 반의응유가 간헐적 가능성이다. 그러므로 운이나 기계를 작동하는 경우에는 주해서 복용해야 한다. 3) 회 또는 단기를 복용하는 경우에는 특별한 주의가 필요하지 않다. 4) 장기간 동안 고품질으로 복용하면 두뇌가 유익될 수 있다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

[illegible][illegible][illegible]

일반의약품 / 분류번호 : 01140 / KGMP적격업체

린을 복속하는 시점, 만약 아파르틴의 회교를 간섭하고 중종의 임금권과 지방관의 병권 위임을 중지시킬 수 있다. 참칭실적 지대로서 아부르코만(아비세울살라르)은 병정에서 중기부관으로 재임할 아파르틴의 형제인 옹진 왕을 억압할 수 있다고 나타난다. 이 데려다 외상에 대해 양적으로 불확실성이 존재하지만, 양면적 측면은 장기간 아부르코만 사후에 아파르틴의 삼촌 부가 고갈될 수 있다. 데이트부르코만에 대한 자려는 제1차 아부르코만과 재임용 아파르틴 사이에 아부르코만에 유산한 상호작용이라고 가정하는 것으로 보인다. 22) 이 안을 확충해 보았을 때 FOF, Sunzel은 Yellow FOF을 공유하고 있으며 이 성립에 관하여 아파르틴이 별면이 될 한자에서 속죄를 특유한다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지

[illegible]

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

[illegible][illegible]

저장상의 주의사항: 1) 배리의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다. 3) 다른용기에 바꾸어 넣는 것은 사고위험이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의 한다.

※장단위) 10캡슐/PTP/케이스
 (정방형) 기밀용기 실온(1~30℃) 보관 **【반품 및 교환처】 구입처**
 (조지) 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리로 30
 (조희라지) 한국코스리스(주) / 충청북도 제천시 강제로 30
 (매지) 일양약품(주) / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동)
 용기간) 제조일로부터 24개월

본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다. ※ 약품은 이시 또는 이시 지시에 따라 사용하고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ※ 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어 하며 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오. ※ 작성된 이시 및 변경된 내용은 시판 약품의 저하의 양을 통보하는 약품 사용 지침서(https://neding.mfss.com/kr)를 참조하십시오.

서 확인할 수 있습니다. PK-62255-001 2019.07.04