

**[원료약품 및 그 분량] 1정 중**

- 유효성분: 알긴산(BP).....200.0mg  
카르복시메틸셀룰로오스나트륨(KP)....100.0mg
- 기타 첨가제: 경질무수구산, 라우릴황산나트륨,  
미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산수화물,  
오파드라이인색(85F18422), 적색산화철, 침강탄산칼슘, 탈크,  
포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

**[성상]** 연한 빨강색의 장방형 필름코팅정제**[효능·효과]** 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

☆ 국내임상시험결과와 추가제출의약품 재평가 진행 중)

**[용법·용량]** 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다.**[사용상의 주의사항]****1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것**

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유소아

**2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것**

다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용 할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.

**3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**

1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.**

1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

**300정****일반의약품****조제용**

# 에이올 정

## AEIOL Tab



2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

**5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항**

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다.

**6. 저장상의 주의사항**1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.  
2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안된다.**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관제조의뢰자 **알보젠코리아(주)**

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 36

소비자 상담전화: 02-2047-7700

(01)08806526070914

\* 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원

(1644-6223, 14-3330)

제조사 **(주)한국파비스제약**

경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

**[취급상의 주의사항]**

1. 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

2. 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

\* 작성년월일: 2022년 09월 25일

제조번호

사용기한



ARTDB023567L

**HDPE**  
뚜껑:LDPE  
재활용 어려움