

가로규격(mm)	세로규격(mm)	원료약봉(μt)	분포(μt)	컬러
110	285	8	8	Black



의약품 분류번호	219
일반의약품	

□원료약품 및 그 분량

이 약 1정 중
 방통통상신진조엑스(4.64→1)(발광).....237.5mg
 첨가제(타르색소) : 황색4호 타르트라진 알루미네이코
 첨가제(타르색소) : 황색5호 섀넬로우 FCF 알루미네이코
 첨가제(타르색소) : 청색1호 브릴리안트블루 FCF 알루미네이코
 첨가제(타르색소) : 청색2호 인디고카로민 알루미네이코

□대상상

녹색의 원형 필름 코팅정

□효능·효과

배에 파하지방이 많고 변비가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨 결림, 흉조), 비만, 부기, 변비

□용법·용량

보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

□사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 대량의 지중수축 작용 또는 골반내 장기의 출혈작용에 의해 유 조산의 위험이 있다.)
 - 수유부(이 약에 함유되어 있는 대량중 안트라퀴논은 유두체는 모유중으로 이행되어 영아 (젖먹이, 갓난아기)에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 다른 설사약
 - 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상담할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 부종(부기) 환자
 - 고령자(노인) (일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통(배앓음), 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 병후(회복 후)의 식욕기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 - 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신(온몸)발열감 등이 나타날 수 있다.)
 - 합성중, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
 - 배뇨(소변을 누)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 감상신경기능장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)
 - 이 약은 황색5호(섀넬로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분 에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여할 것.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상담 할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 할입이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배량량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을

- 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용 을 중지할 것.
- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- (4) 피부 : 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나는 경우
- (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신 흥분 등
- (6) 비뇨기계 : 배뇨(소변을 누)장애
- (7) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신 의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰 을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월(변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상담할 것.
 - 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대량의 사하(설사)작용은 개인차가 있으므로 용법·용량 에 주의할 것.
 - 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우 함유 성분의 중복에 주의해야 한다. 대량 함유제제와 병용(함께 복용(사용))투여 시 특히 주의할 것.
 - 미황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감상신경제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민 제제(에피네프린, 이소프레날린), 코스타닌계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용(함께 복용 (사용))시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
 - 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로 세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이아지드)와 병용(함께 복용 (사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것(양해과림(제일약품) 에 한함).
7. 저장상의 주의사항
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관 할 것.)
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(절대복용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

□포장단위

30정/병, 360정/병

□저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

□제조회사의 제 제 조 자

- 제조회사의 : 제이더블유신약(주) 경기도 평택시 산단로 88-24
- 제 조 자 : 우리들제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

□첨부문서 작성연월일

2017. 04. 20

□교할 및 제품문의

- 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약품을 통하여 교환해 드립니다.
- 이 첨부 문서 작성 일자(2017년 04월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 www.jw-shinyak.co.kr이나 고객센터 1588-4675에서 확인하실 수 있습니다.

jw 신약
제이더블유신약(주)