



건강한 잇몸을 위한 잇몸질환 치료제

덴플러스포르테

DENPLUS-F

【성분·함량】 1캡슐 중

아스코르빈산(KP)	150mg
리소짐염산염(KP)	30mg(약가)
토코페롤아세테이트2배산(EP(dl-α-토코페롤아세테이트로서 5mg)	10mg
카르바조크롬(KP)	2mg
첨가제: 옥수수전분(KP)	75mg
첨가제: 유당수화물(KP)	41mg
첨가제: 크로스카르멜로오스나트륨(NF)	20mg
첨가제: 크로스포비돈(NF)	6mg
첨가제: 경질무수구연산(KP)	2mg
첨가제: 스테아르산마그네슘(KP)	4mg
첨가제(타르색소): 청색 1호	
첨가제(동물유래): 리소짐염산염, 닭의 난백	

【성상】 얇은 주황색의 분말이 든 상·하부 청색의 경질캡슐제

【효능·효과】 치은염(잇몸염), 치조이틀농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 통증)의 완화

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 15세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 4) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약 복용 후 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타난 경우
- 2) 피부: 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리델 증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양의 수포 등 중증의 증상이 전신의 피부, 인과 목의 점막에 나타나는 경우
- 3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 하십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(~30℃)보관 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【포장단위】 자사포장단위 【소비자상담실】 02)3463-7111

【제조자】 (주)테이제이펙스/경기도 안산시 단원구 신단로68번길 58 (초지동)

【판매자】 (주)충근당 계열회사 (주)경보제약 본사·공장: 충청남도 아산시 실목로 174(실목동 345-6) 서울사무소: 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로3가 368)

- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 본 제품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타나거나 의약품이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약물안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpfarm.com에서 확인할 수 있습니다.