

간장보호 · 간기능장애 개선

헤파플러스 연질캡슐

우수약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반 의약품
분류번호 : 391

■ 성분 · 함량 : 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생균)	200mg
티아민질산염(KP)	4mg
피리독산염산염(KP)	4mg
니코틴산아미드(KP)	12mg
판토텐산칼슘(KP)	8mg
시아노코발라민(KP)	1.2μg

착색제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 황색203호

■ 성상 : 황갈색의 내용물을 함유한 황녹색의 장방형 연질캡슐

■ 효능 · 효과

다음 질환의 치료보조 : 만성간질환, 지방간, 간경변, 중독성 간장질환

■ 용법 · 용량

성인 1회 1캡슐을 1일 3회 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.

2. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

3. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 2) 고지혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여뚜껑을 꼭 닫아) 보관 하십시오.
- 3) 오염(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 24개월

■ 포장단위 : 90캡슐, 180캡슐

■ 제조의뢰자 : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동)

■ 제조자 : (주)동구제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

판매처



광동제약(주)

경기도 광명시 신안로 114

www.ekdp.com

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고소(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원 의약품유해사례보고에 알려 주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 023463-7111이나 www.etexpfarm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정일: 2014. 01. 03

HSS01-140103-00