



혈압강하 효과 증대

발사탄플러스 정 80/12.5mg

ValsartanPlus Tab.

(발사르탄/히드로클로로티아지드)

발사르탄은 가장 많이 판매되는 ARB 성분으로 광범위한 표적장기 심혈관 보호효과를 발휘합니다. ARB/이뇨제 복합제는 HCTZ의 부작용을 감소시키고 혈압강하 효과를 증대시키며 당뇨병자의 혈관 기능, 신기능 개선에 효과적입니다.

■ 원료약품 및 그 분량 이 약 1정 중

발사르탄 (USP)	80.0mg
히드로클로로티아지드(KP)	12.5mg
첨가제(타르색소) : 적색 40호 알루미늄레이크	

■ 성상

밝은 오렌지색의 타원형 필름코팅정

■ 효능·효과

단일요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않은 본태성혈압

■ 용법·용량

·성인

권장용량은 발사르탄 80mg/히드로클로로티아지드 12.5mg 1일 1회 1정이며 식사와 상관없이 복용할 수 있으며 소량의 물로 복용합니다. 발사르탄 160mg/히드로클로로티아지드 12.5mg은 혈압강하를 위해 발사르탄 160mg/히드로클로로티아지드 12.5mg으로 처방 받은 경우에 적용합니다. 혈압강하효과는 2~4주 이후 최대효과를 나타냅니다.

·신장애환자

경증~중증도의 신장애 환자(크레아티닌청소율 30mL/min 이상)에 대한 용량조절은 필요하지 않습니다.

·간장애환자

담즙정체가 없는 경증~중증도 간장애 환자에서는 발사르탄으로서 1일 80mg을 초과하여 사용하지 않습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

임부에게 레닌-안지오텐신 시스템에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십 명이 보고된 바 있습니다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 합니다(임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조).

2. 다음 환자에게 투여하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 설문아미드계 약물에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조)
- 발사르탄은 다음과 같은 경우 금기입니다.
 - 중증의 간장애, 담즙성 간경변, 담도폐쇄, 담즙반류성 질환
- 히드로클로로티아지드는 다음과 같은 경우 금기입니다.
 - (1) 중증 신장애 환자(크레아티닌청소율 30mL/min 미만) 또는 급성신부전 환자(신기능의 악화가 나타날 수 있습니다.)
 - (2) 칼륨소실을 증가시키는 상태에, 염소소실 신장병증, 신전성(pre-renal, 심인성) 신기능장애 환자
 - (3) 치료불응성 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 고칼슘증 및 증상성 고요산혈증(통풍 또는 요산 및 병력이 있는 환자를 치료중인 환자 또는 체액 중 나트륨·칼륨이 명백히 감소한 환자(저나트륨혈증, 저칼륨혈증 등 전해질 실조를 악화시킬 수 있습니다.)
 - (4) 치료되지 않은 애디슨 병 및 리튬 병용 치료중인 환자
 - (5) 무뇨증 환자 또는 투석중인 환자(이 약의 효과를 기대할 수 없습니다.)
- 유전성 혈관부종을 앓고 있거나, 과거에 ACE억제제나 안지오텐신II수용체 길항제를 복용하여 혈관부종이 발생한 환자

3. 다음 환자에게 신중히 투여하십시오.

- 전해질질 변화 환자
- 나트륨 및/또는 체액 결핍 환자
- 신장애 환자
- 간장애 환자
- 전신성 홍반성 루푸스 환자
- 급성 폐쇄각 녹내장 환자
- 뇌혈관장애 환자(과도한 혈압강하가 뇌혈류부전을 야기하여 상태를 악화시킬 수 있습니다.)
- 감염요법 중인 환자(저나트륨혈증을 일으킬 수 있습니다.)
- 중증 관경화증 또는 뇌동맥경화증 환자(급격한 이뇨가 나타났을 경우 급속한 혈장량 감소, 혈액 농축을 초래하여 혈전색전증을 유발할 수 있습니다.)
- 본인에 당뇨병 또는 부종, 항제에 통풍, 당뇨병 또는 고요산혈증이 있는 환자(고요산혈증, 고혈당증을 초래하여 통풍, 당뇨병의 악화나 현상화할 수 있습니다.)
- 설사, 구토가 있는 환자(전해질 질조가 나타날 수 있습니다.)
- 부갑상선기능항진증 환자(혈청 칼슘을 상승시킬 수 있습니다.)
- 다기혈리아, 부신피질호르몬제 또는 ACTH를 투여 중인 환자(이 약의 혈압강하 작용을 중강시킬 수 있습니다.)
- 교감신경절제 후 환자(이 약의 혈압강하작용이 증강될 수 있습니다.)
- 고령자

4. 이상반응

1) 발사르탄-히드로클로로티아지드 복합제

(1) 4,300명 이상의 환자에서 이 약의 안전성을 평가하였습니다. 이상반응은 대개 일시적이고 경중이었습니.

다음 이상반응 표는 총 7,616명의 환자(이 약 투여 환자수 4,372명)에 대해 시행한 3개의 대조임상시험을 바탕으로 한 것입니다. 이 약에서 발생한 이상반응 발생률은 위약에서와 유사했습니다. 이 약에서 1% 또는 그 이상의 발생률을 보인 모든 이상반응은 시험약과의 인과관계에 상관없이 다음 표에 포함시켰습니다.

구 분	이 약* (n = 4,372), %	위약(n = 262), %
두통	3.7	14.5
어지럼	3.5	3.8
비인두염(Nasopharyngitis)	2.4	1.9
피로	1.6	1.5
요통	1.2	2.7
기침	1.2	0.8
상부호흡기감염	1.2	3.4
설사	1.1	1.1
관절통	1.0	1.1

* 발사르탄 80mg, 160mg, 320mg과 히드로클로로티아지드 12.5mg, 25mg의 모든 조합을 포함.

- 기타 : 1% 미만의 이상반응은 복통, 상복부통, 사아호흡, 사각이상, 불안, 관절염, 기관지염, 급성기관지염, 가슴통증, 기립성 어지럼, 구강건조, 소화불량, 호흡곤란, 발기부전, 위장장애, 다한증, 감각저하, 불면, 저칼륨혈증, 저혈압, 인슐린저항성, 근육연축, 근염, 구역, 비충혈, 비강출혈, 목의 통증, 중이염, 사지통, 이상감각, 인후두통, 발열, 부비동염, 무비동염, 졸음, 다리 경련, 빈뇨, 두근거림, 발진, 인대염, 실신, 빈맥, 이명, 요로감염, 바이러스 감염, 부종, 말초부종, 무력증, 어지럼 등이었으며 이 약과의 인과관계는 밝혀지지 않았습니다.
- 국외 시험 후 조사결과 다음과 같은 이상반응이 매우 드물게 나타났습니다 : 혈관부종, 발진, 가려움, 혈청병과 혈관염을 포함한 기타 과민반응,일례기 반응, 고칼륨혈증, 탈모, 신기능 손상, 근육통, 과립구 침윤과 폐포막의 IgG 축적(등반되는 히드로클로로티아지드 유도성 폐부종이 여러 건 보고된 바 있습니다. 바-심인성 폐부종은 히드로클로로티아지드에 대해 드물게 나타나는 면역학적 특이 반응으로 나타날 수 있습니다.)
- 국외(일본에서 실시한 임상시험에서 발사르탄-히드로클로로티아지드 복합제가 투여한 환자에서 이상반응이 보고된 것은 656예 중 288예(43.9%)이며 중대한 이상반응은 다음과 같습니다.
 - 아나필락시스모양 증상(빈도불명) : 아나필락시스모양 증상을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 혈관부종(빈도불명) : 얼굴, 입술, 인두, 혀의 부어오름 등의 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 간염(빈도불명) : 간염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 신부전(빈도불명) : 신부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 고칼륨혈증(빈도불명) : 중증 고칼륨혈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 저나트륨혈증(빈도불명) : 관대감, 식욕부진, 구역, 구토, 의식장애 등을 동반하는 저나트륨혈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다(고령자에게 나타나기 쉽습니다.)
 - 소크, 실신, 의식상실모양 빈도불명) : 소크, 혈압저하에 따르는 실신, 의식상실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 특히 엄격한 감염요법치료 중, 혈압강하 이노제의 투여 중의 환자에서는 환자의 상태를 충분히 관찰해야 합니다.
 - 무과립구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소모양 빈도불명) : 무과립구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈모양 빈도불명) : 중증의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 과사성혈관염(빈도불명) : 과사성혈관염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 독성표피괴사증후군(빈도불명) : 독성표피괴사증후군(스테vens-Johnson 증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 간질성폐렴(빈도불명) : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선이상 등을 동반한 간질성폐렴이 나타날 수 있으므로 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 부신피질호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 합니다.
 - 폐수종(빈도불명) : 폐수종이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 전신 홍반성 루푸스의 악화(빈도불명) : 전신 홍반성 루푸스를 악화시킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 저혈당(빈도불명) : 저혈당이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 탈락감, 공복감, 식은땀, 손의 떨림, 진동증 저하, 경련, 의식장애 등이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다(당뇨병 치료 중의 환자에서 나타나기 쉽습니다.)
 - 황문근용해증(빈도불명) : 근육통, 탈락감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 또는 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 황문근용해증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 국내 시험 후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 725명을 대상으로 실시한 시험 후 사용성적조사결과 이상반응의 발현증례들은 인과관계와 상관없이 262명(19례/725례로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.79%(13례/725례)입니다. 두통, AST상승, 어지럼, 두근거림, 소화불량(각 0.28%(2례), 부종, 무력, 고중성지방혈증, 크레아틴키나아제(CK) 증가, 기침이 0.14 % (1례)로 나타났습니다. 시험 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 크레아틴키나아제 증가가 보고되었습니다.

- 발사르탄 단독투여 임상시험 중 인과관계와 상관없이 보고된 기타 이상반응 중 1% 이상의 빈도로 발생한 것은 관절통, 1% 미만으로 상복부통, 급성신부전, 간헐적 가파른 수치 상승, 부종, 무력증, 불면증, 발진, 어지럼이 있었습니다.
- 히드로클로로티아지드는 포함된 티아지드계 이노제를 단독으로 투여시 다음과 같은 이상반응이 보고되었습니다.
 - 전해질 및 대사성 이상 : 매우 자주(특히 고용량에서) 저칼륨혈증, 혈중 지질 상승, 자주 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증 및 고요산혈증, 드물게 고칼슘혈증, 매우 드물게 저염소혈증성 알칼리증이 나타날 수 있습니다. 포도당 내성을 변경시킬 수 있고, 혈청 콜레스테롤, 중성지방 및 요산 수치의 증가를 일으킬 수 있습니다. 드물게 고혈당증, 당뇨병, 당뇨병에서의 악화가 나타날 수 있습니다(단독투여항 참조).
 - 피부 : 자주 두드러기 및 다른 종류의 피부발진, 드물게 광민감반응, 매우 드물게 과사성 혈관염 및 독성표피괴사증후군(스테vens-Johnson 증후군), 피부 홍반성 루푸스모양 반응, 피부 홍반성 루푸스의 재발
 - 소화기계 : 자주 식욕감퇴, 경증의 구역, 구토, 드물게 복부불편감, 변비, 설사, 위장관계 불편감, 매우 드물게 췌장염
 - 간 : 드물게 간내 담즙정체 또는 황달
 - 순환기계 : 자주 기립성저혈압(요통, 마취제 또는 진정제에 의해 악화될 수 있습니다.), 드물게 심장 부정맥
 - 중추신경계 : 감각소실 또는 진전, 드물게 두통, 어지럼, 수면장애, 우울증, 이상감각
 - 감각기관 : 드물게 시각장애(처음 첫 주에 주로 나타날 수 있습니다.)
 - 혈액계 : 드물게 혈소판감소증(때때로 자반을 동반), 매우 드물게 백혈구감소증, 무과립구증, 골수기능부전, 용혈성 빈혈
 - 기타 : 자주 발기부전, 매우 드물게 과민성 빈증, 폐렴, 폐부종을 포함한 호흡곤란
 - 국외 시험 후 감형으로 부러의 약물 유해 반응(빈도불명) : 급성 신부전, 신장애, 재생불량성빈혈, 다형 홍반, 발열, 근육연축, 무력, 급성 폐쇄각 녹내장

5. 일반적 주의

- 운전과 기계조작 수행에 대한 이 약의 효과에 대한 연구는 없으나 운전 또는 기계조작을 할 때 어지럼 또는 졸음이 나타날 수 있다는 것을 고려해야 합니다.
- 중증성 저혈압 : 이 약을 투여 받는 환자에게 특히 치료 첫 수일 동안 어지럼이 발생할 수도 있다는 주의사항을 설명하고, 어지럼 발생 시 의자에게 알리도록 하여야 합니다. 또한 환자들에게 부적절한 수액 투여, 과도한 발한, 설사, 또는 구토가 과도한 혈압 강하를 일으켜 현기증 및 실신이 나타날 수 있다는 주의사항도 설명해야 합니다.
- 칼륨보충 : 이 약을 투여 받는 환자에게 의사와 상의 없이 칼륨보충제 또는 칼륨함유 염류제를 사용하지 않도록 교육하여야 합니다.
- 신동맥협착증 : 이 약을 투여하여 인 및 혈액요소가 증가할 수 있으므로 양측 또는 단측 신동맥협착증 환자, 협착증이 일어난 단측성 환자에 이 약을 사용해서는 안 됩니다.
- 티아지드계 이노제는 새롭게 저칼륨혈증을 발생시키거나 기존의 저칼륨혈증을 악화시킬 수 있습니다. 칼륨 저하가 심해진 환자(예, 염-소실 신장병증 및 신전성(pre-renal, 심인성) 신기능장애 환자)에게 티아지드 이노제 투여 시 주의하여야 합니다. 저칼륨혈증이 임상증상(예, 근육약화, 불안정맥비, 또는 심전도변화)을 동반하는 경우, 이 약의 투여는 중지되어야 합니다. 티아지드계 이노제는 저칼륨혈증 및 용반된 저마그네슘혈증이 있을 경우 교정치료 후에 투여하는 것이 권장됩니다. 칼륨 및 마그네슘의 혈중 농도는 정기적으로 확인해야 합니다. 티아지드계 이노제를 투여 받는 모든 환자는 전해질, 특히 칼륨의 불균형을 모니터링하여야 합니다. 티아지드계 이노제는 저나트륨혈증 및 저염소성 알칼리증을 새롭게 발생시키거나 기존의 저나트륨혈증을 악화시킬 수 있습니다. 신장애 증상(구역, 진행성 방항감각이상, 무감각)이 동반된 저나트륨혈증이 개별 사례로 관찰된 바 있습니다. 혈청 나트륨 농도의 정기 모니터링이 권장됩니다.
- 고용량의 이노제 투여로 중증의 나트륨 결핍 및/또는 체액결핍이 나타난 환자의 경우 이 약 투여 초기에 드물게 중증성 저혈압이 나타날 수 있습니다. 따라서 반드시 나트륨 및 체액결핍상태를 보정한 후 이 약을 투여하고, 그렇지 못한 경우는 의료전문가 감시하에 투여하도록 합니다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 반듯한 자세로 눕히고 필요하다면 생리식염 주사액을 점적주입합니다. 혈압이 안정된 후 약물투여를 계속합니다.

- 7) 경증~중등도 신장에 환자(크레아티닌청소율 $\geq 30\text{mL/min}$)에게 투여 시 용량조절은 필요하지 않습니다. 이 약은 하이드로클로로티아지드를 함유하기 때문에 중등도의 신장에 환자(크레아티닌청소율 $<30\text{mL/min}$)에게 이 약은 금기입니다. 티아지드계 이뇨제는 만성 신장 질환 환자에게 질소혈증을 유발할 수 있습니다. 이 약을 신장에 환자에 사용할 경우 혈청 칼륨, 크레아티닌 및 요산 레벨의 정기적인 모니터링이 권장됩니다.
- 8) 신이성 환자 : 최근 신이성을 한 환자에게 이 약의 사용에 대한 안전성 자료가 없습니다.
- 9) 경증~중등도 간장애 환자에게 이 약 투여 시 용량 조절은 필요하지 않으나 발사르탄으로서 1일 80mg을 초과하지 않는 것이 바람직합니다. 간기능 장애 또는 진행성 간질환이 있는 환자의 경우, 체액 및 전해질 균형에 약간의 변화만으로 간성 혼수를 일으킬 수 있기 때문에 티아지드계 이뇨제는 주의하여 사용해야 합니다.
- 10) 티아지드계 이뇨제는 전신성 홍반성 루푸스를 일으키거나 악화시킬 수 있습니다.
- 11) 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제는 포도당 내성을 변경시킬 수 있고 혈청 콜레스테롤 및 트리글리세라이드의 증가를 일으킬 수 있습니다. 다른 이뇨제와 마찬가지로 히드로클로로티아지드는 요산의 청소율을 감소시켜 혈청 요산의 수치를 증가시킬 수 있으며 고요산혈증을 유발 또는 악화시켜서 감수성이 있는 환자에게 통풍을 발생시킬 수 있습니다. 당뇨병 환자에서 인슐린 또는 경구 혈당강화제의 용량 조절이 필요할 수 있습니다. 티아지드계 이뇨제는 칼슘 대사에 이상이 없는 경우에도 요 중 칼슘 배설을 감소시켜 혈청칼슘농도를 약간 상승시킬 수 있습니다. 히드로클로로티아지드는 혈청 칼슘 농도를 증가시킬 수 있기 때문에 고칼슘혈증 환자에게 투여 시 주의해야 합니다. 티아지드계 이뇨제의 투여 중지에 불응하거나 또는 12mg/dL 이상의 현저한 고칼슘혈증을 보이는 경우는 티아지드계 이뇨제와 무관한 다른 원인에 의한 고칼슘혈증일 수 있습니다. 지속적으로 티아지드계 이뇨제 치료를 받은 몇몇 환자에서 고칼슘혈증 및 저인산혈증과 함께 부갑상선의 병리적 변화가 관찰된 바 있습니다. 고칼슘혈증이 발생하면 부갑상선 기능검사가 필요할 수 있습니다. 티아지드계 이뇨제는 부갑상선 기능검사를 시행하기 전 투여를 중단해야 합니다. 티아지드계 이뇨제는 갑상선 장애의 징후 없이 혈청 단백질 결합 요오드 수치를 감소시킬 수 있습니다.
- 12) 광민감반응 : 티아지드계 이뇨제에서 광민감반응의 사례가 보고되었습니다. 치료중 광민감반응이 나타날 경우 치료를 중단하는 것이 권장됩니다. 티아지드계 이뇨제의 재투여가 필요할 경우 햇빛 또는 인공 UVA 차광이 권장됩니다.
- 13) 히드로클로로티아지드, 설폰아미드는 급성 일과성 근시 및 급성 폐색각 녹내장을 유발합니다. 시력 저하 또는 눈의 통증이 급성으로 시작되고 전형적으로 투여 개시 후 수 시간에서 수 주 이내에 발생합니다. 설폰아미드 또는 페니실린 알레르기의 병력이 급성 폐색각 녹내장을 발생시키는 위험 요인이 될 수 있습니다. 급성 폐색각 녹내장을 치료하지 않으면 영구적 시력 손실이 될 수 있습니다. 일차 치료는 가능한 빨리 히드로클로로티아지드의 투여를 중지하는 것입니다. 만약 안압이 조절되지 않는다면 즉각적인 약물 또는 외과적 처치를 고려할 필요가 있습니다.

6. 상호작용

- 1) 발사르탄에 의해 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있습니다.
 - (1) 발사르탄의 단독 투여 시 다음 약물과의 임상적으로 유의한 상호작용은 관찰되지 않았습니다. : 시메티딘, 와르파린, 푸로세미드, 다국산, 이테놀롤, 인도메타신, 히드로클로로티아지드, 암로디핀, 클리베클라마이드
 - (2) 칼륨 : 칼륨보존 이뇨제, 칼륨보충제 및 칼륨함유 염류제나 혈청 칼륨수치를 변화시킬 수 있는 다른 약물(예, 해파린)과의 병용은 권장하지 않습니다.
 - (3) 비스테로이드소염진통제(NSAID) : 안지오텐신수용체 길항제가 NSAIDs에 항염증요법으로 아스피린 COX-2저해제와 동시에 투여되었을 때 항고혈압 효과가 감소할 수 있습니다. 특히 노인환자, 체액이 부족한 환자(이뇨제 투여환자 포함, 또는 신장기능이 저하되어 있는 환자의 경우 신장기능 약화의 위험성을 증가시킬 수 있습니다. 그러므로 NSAIDs를 투여하고 있는 환자에게 발사르탄 투여를 시작하거나 투여 방법을 변경할 때에는 신장기능의 모니터링이 권장됩니다.
 - (4) 발사르탄은 유의한 수증기차 대시되지 않기 때문에, 임상적으로 CYP450효소계의 대사유도 또는 대사저해에 의한 약물간 상호작용은 나타나지 않을 것으로 예상됩니다. 발사르탄은 혈청 단백질과 강하게 결합함에도 불구하고, 생체의 실험에서 디클로페낙, 푸로세미드 및 와르파린과 같이, 단백질과 강하게 결합하는 일련의 분자와 이 수준에서 어떠한 상호작용도 나타내지 않았습니다.
- 2) 이 약의 주성분 중 하나인 티아지드계 이뇨제로 인하여 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있습니다.
 - (1) NSAIDs 및 COX-2 선택적 차단제 : NSAIDs에 : 살리실산 유도체, 인도메타신과의 병용투여는 티아지드계 이뇨제의 이뇨작용과 항고혈압 효과를 약화시킬 수 있습니다. 합병증으로 저혈량증이 있을 경우 급성 신부전증이 나타날 수 있습니다.
 - (2) 혈청 칼륨 수치에 영향을 미치는 약물 : 이뇨제의 저칼륨혈증 작용은 칼륨 배설성 이뇨제에, 푸로세미드, 코르티코스테로이드, ACTH, 암포테리신, 카르바마제핀, 페니실린G 및 살리실산 유도체 또는 항부정맥제와의 병용 투여에 의해 증가될 수 있습니다.
 - (3) 이온교환수지 : 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 음수는 클레스티라민 및 클레스티롤로 인해 감소됩니다.
 - (4) 골격근 이완제 : 티아지드계 이뇨제는 쿠라레 유도체와 같은 골격근 이완제의 작용을 강화시킬 수 있습니다.
 - (5) 당뇨병용제 : 티아지드계 이뇨제는 포도당의 내성을 변화시킬 수 있으므로 인슐린이나 경구용 당뇨병약의 용량 조절이 필요할 수 있습니다. 히드로클로로티아지드로 인한 기능성 신부전 유발 시 메트포르민의 병용투여로 젃산산중독(acid acidosis)위험이 나타날 수 있기 때문에 주의하여 병용 투여하여야 합니다.
 - (6) 아민타딘 : 티아지드계 이뇨제히드로클로로티아지드 포함과 병용 투여는 아민타딘에 의한 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
 - (7) 항콜린성 약물 : 티아지드계 이뇨제의 생체이용률은 항콜린성 약물(예 : 아트로핀 비페리덴)과의 병용으로 증가될 수 있으며 이것은 위장관계 운동이 감소되고 위배출시간이 느려지기 때문입니다. 반대로 시시프리드와 같은 위장운동 촉진제는 티아지드계 이뇨제의 생체이용률을 감소시킬 수 있습니다.
 - (8) 메틸도파 : 메틸도파와 히드로클로로티아지드의 병용시 용혈성 빈혈이 보고된 바 있습니다.
 - (9) 비타민 D : 티아지드계 이뇨제를 비타민 D 또는 칼슘과 병용시 혈청 칼슘 수치를 증가시킬 수 있습니다.
 - (10) 시클로스포린 : 시클로스포린과의 병용은 고요산혈증과 통풍형(gout-type) 합병증의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
 - (11) 알코올, 바르비트레이트 또는 마약 : 알코올, 바르비트레이트 또는 마약과의 병용 투여는 기립저혈압의 발생을 증가시킬 수 있습니다.
 - (12) 혈압상승 아민류 : 히드로클로로티아지드는 노르아드레날린과 같은 승압 아민류의 반응을 감소시킬 수 있습니다. 그러나 임상적 유의성은 명확하지 않고, 혈압상승 아민류의 사용을 제한할 정도로 나타나지 않았습니다.
 - (13) 디기탈리스 배당체 : 티아지드계 이뇨제로 인한 저칼륨혈증 또는 저마그네슘혈증은 디기탈리스로 인한 심장부정맥을 더 쉽게 유발시킬 수 있습니다.
 - (14) 혈청 나트륨 수치에 영향을 미치는 약물 : 히드로클로로티아지드와 카르바마제핀을 병용투여하는 환자에서 저나트륨혈증이 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 환자들에게 저나트륨혈증 발현의 가능성에 대하여 알려주어야 하며 적절히 모니터링 하여야 합니다.
 - (15) 리튬 : 리튬제와 ACE억제제, 티아지드계 이뇨제의 병용투여로 혈청 리튬 농도의 가역적 증가와 리튬 독성의 증가가 보고되었습니다. 발사르탄과 리튬의 병용투여한 임상경험은 없습니다. 리튬과 이 약과의 병용투여는 권장되지 않습니다. 병용의 필요성이 증명된 경우 혈청 리튬 수치의 모니터링이 권장됩니다.
 - (16) 다른 항고혈압 약물 : 티아지드계 이뇨제는 다른 항고혈압약물(예, 구아네티딘, 메틸도파, 베타차단제, 혈관이완제, 칼슘통로 차단제, ACE억제제, 안지오텐신II수용체 길항제 및 직접적 레닌 차단제(DRI))와 항고혈압 작용을 증강시킵니다.
 - (17) 알로푸리놀 : 티아지드계 이뇨제히드로클로로티아지드 포함과 병용 투여는 알로푸리놀에 대한 과민반응 발생률을 증가시킬 수 있습니다.
 - (18) 항종양제(예, 시클로포스파미드, 메토트렉세이트) : 티아지드계 이뇨제히드로클로로티아지드 포함과 병용 투여는 세포독성약 물질의 신장배설을 감소시킬 수 있으므로 골수억제 효과를 강화시킬 수 있습니다.
 - (19) 칼슘염류 : 티아지드계 이뇨제의 병용투여는 세뇨관에서 칼슘 재흡수를 증가시켜 고칼슘혈증을 유발할 수 있습니다.
 - (20) 티아지드계 및 베타차단제 : 티아지드계 이뇨제는 디아족시드의 고혈당 효과를 증가시킬 수 있습니다. 베타차단제와 티아지드계 이뇨제와의 병용은 고혈당 위험을 증가시킬 수 있습니다.
 - (21) 요오드 조영제 : 이뇨제에 기반한 염수의 경우, 특히 고용량의 요오드 제제를 병용하였을 때 급성 신부전의 위험이 증가됩니다. 투여 전 재수화(hydration) 해야 합니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 안지오텐신수용체 길항제의 작용기전 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없습니다. 임신 2~3기 사이에 ACE억제제(레닌-안지오텐신-알도스테론 계RAAS)에 작용하는 특정 약물군에 노출된 임부에서 태아발달손상 및 사망을 일으킨다는 보고가 있습니다. 또한 후향적 자료에 의하면, 임신 17주에 ACE억제제를 사용하는 것은 출생결함의 잠재적 위험과 연관 있었습니다. 태아의 신장기능은 임신 27주에 형성되며, 레닌-안지오텐신 시스템의 영향을 받기 때문에 임신 2, 3기에 발사르탄을 복용하면 위험이 증가합니다. 임신 2~3기 동안 레닌-안지오텐신계에 직접 작용하는 약물의 사용은 저혈압, 신생아 두개골 저형성증, 무호흡, 가역적 또는 비가역적 신부전 및 사망을 포함한 태아 및 신생아의 손상과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 양수과소증이 보고된 바 있으며, 양수과소증은 태아 사지구축, 두개안면 기형, 및 폐 발육부진 등과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 약물노출과의 관련성이 명확하지 않으나, 미숙아 출산, 자궁내 발육 부진 및 동맥관 개존증이 또한 보고되었습니다. 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 자궁 노출 시 태아 또는 신생아의 황달, 혈소판감소증이 유발될 수 있고 성인에 나타나는 다른 이상반응도 일어날 수 있습니다. 임부가 우발적으로 발사르탄을 복용했을 때 자궁 유산, 양수과소증, 신생아 신기능 이상이 나타났다는 보고가 있었습니다. 자궁 내에서 약물에 노출되었던 모든 신생아에 대해서는 배뇨작용, 고칼륨혈증, 그리고 혈압을 검사합니다. 필요한 경우에는, 순환계에 녹아있는 약물을 없애기 위한 의학적 조치를 취합니다. 다른 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물처럼 이 약도 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에서 사용해서는 안되며, 투약 중 임신이 확인되면 즉시 투약을 중지합니다. 드물게 1,000명의 임부 당 1명 미만에서 레닌-안지오텐신계에 작용하는 대체 약물을 찾기 못할 수 있습니다. 이러한 경우에 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신 가능성이 있는 여성에게 처방하는 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려 주어야 하며 양수 내 환경을 평가하기 위해 지속적으로 초음파 검사를 시행하여야 합니다. 양수과소증이 관찰되면 임부의 생명을 구하기 위한 것을 제외하고는 이 약을 중단하여야 합니다. 임신 주수에 따라 수축 자극 검사(Contraction stress testing : CST), 무자궁경색(Nonstress test : NST), 또는 생물리학적 프로파일(biophysical profiling : BPP) 검사가 적절할 수 있습니다. 그러나 환자와 의사는 태아가 이미 비가역적인 손상이 발생한 이후에도 양수과소증이 나타나지 않을 수 있다는 것을 인식하고 있어야 합니다. 자궁속에서 안지오텐신수용체 길항제에 노출된 적이 있는 유아는 저혈압, 빈뇨, 및 고칼륨혈증이 있는지 면밀히 관찰되어야 합니다. 빈뇨가 있다면, 혈압 및 신장관류 유지에 주의를 기울여야 합니다. 저혈압을 회복시키고 신기능을 대신하기 위해 교환수혈이나 투석이 필요할 수 있습니다.
- 2) 발사르탄이 사람에서 모유 중에 분비되는지의 여부는 밝혀지지 않았으나 컷트에 대한 시험에서 모유 중에 발사르탄의 분비가 확인되었습니다. 히드로클로로티아지드는 태반을 통과하고 사람에서도 모유로 분비됩니다. 따라서 수유부가 이 약을 사용하는 것은 비 권장하지 않습니다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약의 비교 임상시험에서 고령군과 비고령군 사이에 발사르탄-히드로클로로티아지드의 유효성 및 안전성에 대한 전반적인 차이는 관찰되지 않았습니다.

10. 임상감시치의 영향

- 1) 이 약을 투여받은 환자의 3.7%, 위약환자의 3.1%에서 20% 이상의 혈청 칼륨 감소가 나타났습니다(대신증투여향 참조).
- 2) 다음 결과가 발사르탄 단일요법에서 나타났으나, 이 약 투여시에는 나타나지 않았습니다. : 드물게 헤모글로빈 및 헤마토크리트 치 감소가 나타났습니다.
- 3) 대조임상시험 결과 헤마토크리트 및 헤모글로빈의 유의적 $>20\%$ 인 감소가 각각 0.8%, 0.4% 나타났습니다. 반면 위약의 경우 모두 0.1%가 감소했습니다.
- 4) 대조임상시험 결과 혈청 크레아티닌, 칼륨 및 총 빌리루빈의 농도의 유의적인 증가가 발사르탄 투여 환자의 경우 0.8%, 4.4%, 6.0%였고 ACE억제제의 경우 1.6%, 6.4%, 12.9%였습니다. 또한 대조임상시험에서 이 약 투여군에서는 크레아티닌과 BUN 상승이 각각 1.9%, 14.7% 나타났고, 위약 투여군에서는 각각 0.4%와 6.3% 나타났습니다.
- 5) 때때로 발사르탄의 투여로 간기능 검사치의 상승이 보고되었습니다.
- 6) 이 약을 투여하는 본태고혈압 환자에 대해 특별한 임상감시치의 모니터링이 필요한 정도는 아닙니다.
- 7) 호중구감소는 이 약을 투여받은 환자의 0.1%에서, 위약을 투여받은 환자의 0.4%에서 관찰되었습니다.

11. 과량투여시의 처리

- 1) 사람에 대한 과량 투여 관련 데이터는 제한적입니다. 과량투여로 나타나기 쉬운 증상은 저혈압과 빈맥입니다. : 발사르탄의 과량 투여는 현저한 저혈압을 일으킬 수 있고, 이는 의식저하, 순환성 저하 및 소크로 나타날 수 있습니다. 복용 직후이면 구토를 유도하고, 그 외에는 생리식염 주사액을 정맥 내에 주입합니다.
- 2) 히드로클로로티아지드의 과량투여 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. : 구역, 졸음, 저혈량증, 부정맥과 관련된 전해질 이상, 근육경축, 과광투여 이후 시간 경과에 따라 증상들이 증상의 정도에 따라 조치해야 하나 순환안정의 회복이 가장 중요합니다. 만일 복용 직후라면 구토를 유도하고, 복용 후 시간이 많이 경과했다면 적당한 양의 활성탄을 투여합니다.
- 3) 저혈압의 경우 환자를 반듯이 눕히고 가능한 한 빨리 혈장대체를 합니다. 발사르탄은 혈장대체와의 강한 결합 때문에 혈액투석으로는 제거되지 않으나 히드로클로로티아지드는 투석으로 제거될 수 있습니다.

12. 보관 및 취급주의 사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 약약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약약품 오용에 의한 사고 발생이나 약약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

13. 기타

여러 종의 동물을 이용한 발사르탄, 히드로클로로티아지드, 발사르탄/히드로클로로티아지드의 전임상 안전성실험에서, 전신 또는 특정 장기에 대한 독성의 증가는 없었습니다. 발사르탄/히드로클로로티아지드(100/31.25~600/187.5mg/kg)의 고용량은 랫드에서 적절할 수 있음(적혈구, 헤모글로빈, 헤마토크리트)를 감소시켰으며, 신장의 혈역학을 변화시켰습니다(중등도 내지 중증의 혈중 요소 증가, 혈청 칼륨 및 마그네슘의 증가, 경증의 요양 및 전해질 증가, 약간의 세포내 용액기구증상, 최고 용량에서 수혈 소동맥벽 비대(different arteriolar hypertrophy) 비대). 마모셋에서(30 : 9.375~400 : 125mg/kg), 변화는 상당히 유사하였으나 더 중증의 양상을 나타냈습니다. 특히 고용량의 경우 신장에서 신병증이 나타났으며, 이는 요소와 크레아티닌 증가를 포함하였습니다. 신 방사구체세포(renal juxtaglomerular cell)의 비대 또한 두 종에서 관찰되었습니다. 모든 변화는 발사르탄/히드로클로로티아지드의 상승적인(부가적이) 보인, 발사르탄 단독에 비해 약 10배 상승) 약리 작용에 의한 것으로 간주되며, 특히 마모셋에서 오랫동안 저혈압을 나타냈습니다. 발사르탄-히드로클로로티아지드의 치료용량은 사람에서, 방사구체세포 비대에 관련하지 않을 것으로 보입니다. 주요 전임상 안전성 결과는 상승적으로 작용하는 것으로 보이는 약물의 약리작용에 의한 것이며, 두 약물간의 다른 상호작용의 증가는 없습니다. 임상시험에서, 두 약물의 작용은 부가적이었으며, 전임상 결과는 임상적 의미를 나타내지 않았습니다. 발사르탄/히드로클로로티아지드는 상호작용의 증가가 없었으며, 이에 병용으로 돌연변이 유발, 염색체 이상, 또는 발암성을 시험하지는 않았습니다. 그러나 발사르탄과 히드로클로로티아지드는 각각 돌연변이 유발, 염색체 이상, 발암성 시험을 하였으며, 모두 음성결과를 나타냈습니다.

■ 저장방법

기밀용기, 30℃ 이하 보관

■ 사용기한

외부 포장에 표시된 사용 기한 내에 사용하십시오.

■ 포장단위

30정, 100정

■ 제조의뢰 · 판매자 : 한울바이오파마(주)

■ 제조자 : 안국약품(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 40

- ※ 본 약품은 GMP 등록에 따라 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품의 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- ※ 약약품 용어설명 및 기타 자세한 약약품정보는 이지드넷(<http://ezdrug.kdca.go.kr>) → "정보마당" → "약약품" 정보로 참조하시기 바랍니다.

VSP-4-0

12-12-31



한울바이오파마 | 주

서울시 송파구 오금로 58, 6F / 공장 : 대전광역시 대덕구 상서당1길 43

고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr