



일반의약품

분류번호 237(정장제)

원료약품의 분량 (1정중)

락토바실러스 스포로게네스균(별규) (생균수로서 8.0×10^7)개	40.0mg
바실러스 서브틸리스균(별규) (생균수로서 12.0×10^5)개	12.0mg
티아민!질산염3배산(KP) (티아민!질산염으로서 1.6mg)	4.8mg
우르소데옥시콜산 (KP)	10.0mg

성상

이 약은 백색의 오각형 필름코팅정입니다.



효능·효과

정장, 변비, 묽은 변, 복부(배부분) 팽만감, 장내이상발효, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감.

용법·용량

15세 이상 성인: 1회 2정, 1일 3회,
8 ~ 14세: 1회 1정, 1일 3회
식후에 씹지 말고 물과 함께 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.
2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

360정, 720정

○이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

○이 설명서는 2015년 7월 7일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)

※5030422-1150707

※5030422-1150707

ILDONG

ILDONG