

의약품 분류번호	325 단백 아미노산제제
-------------	---------------------

먹는 탈모치료제

볼두민[®]캡슐

Baldmin[®]Cap.



일반의약품

□원료약품의 분량

1캡슐 중	
약용효모(별규).....	100mg
케라틴(별규).....	20.0mg
(약용효모 및 케라틴 중 아미노산으로서 트레오닌3.28mg, 이소류신3.03mg, 페닐알라닌2.66mg)	
티아민질산염(KP).....	60.0mg
판토텐산칼슘(KP).....	60.0mg
L-시스틴(BP).....	20.0mg
파라아미노벤조산(USP).....	20.0mg
첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호	

□성상

연화색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색(연노랑)의 불투명한 경질캡슐제

□효능·효과

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 확산성 탈모의 완화

□용법·용량

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용
 소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

□사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
2. 부작용
 드물게 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 소양증(가려움증), 두드러기 등이 보고 되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의
 1) 설폰아미드제제와 동시 복용 시 주의하십시오.
 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 마십시오.
 3) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의하십시오.
4. 임부, 수유부에 대한 투여
 임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의하십시오.
5. 적응상의 주의
 1) 평균 치료 기간은 3~6개월이고 보통 약 3~4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복 투여할 수 있습니다.
 2) 본 제제는 당뇨병환자에 투여할 수도 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 마십시오.
 2) 어린이아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

□포장단위

자사포장단위

□저장방법

차광기밀용기, 25℃ 이하보관

□교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 고객센터팀 1588-2675

[제조사] 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245



첨부문서 작성년월일 : 2014. 5. 19 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자

jw

중외제약

제이더블유중외제약(주)
 충남 당진시 송악읍 한진1길 56