

엘카탄정

(L-카르니틴)

ELCATAN Tab.

일반의약품

분류번호 : 219

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

본 제품은 인습성이 강하므로 PTP 상태로 조제하여 주시기 바랍니다.

● 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

L-카르니틴 (USP) 330mg

● 성상

흰색의 원형 필름코팅정

● 효능 · 효과

- 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
- 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색

● 용법 · 용량

성인 : L-카르니틴으로서 1일 2-3g을 2-3회 분할 경구투여한다(복용한다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약에 과민증 환자

2. 부작용

일시적인 구역 · 구토, 복통(배아픔), 설사, 체취가 나타날 수 있다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우울)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 신중히 투여한다.

● 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● 제 조 자 : (주)씨티엘 경기도 남양주시 경강로 27

● 제조의뢰자 : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 개봉방법



① 포장 뒷면의 절취선을 따라 1정씩 자르세요.



② 포장 앞면을 눌러 약을 꺼냅니다.

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. PTP포장을 개봉하여 복용 시 기밀 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.
3. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 「소비자분쟁 해결기준」에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 「<http://drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.



경남제약(주)
Kyung Nam Pharm. Co., Ltd.

첨부문서 작성연월일 2015. 11. 19.

2015. 11. 19 - 표시기재 변경

경남제약 디자인팀 김민지 - 02-3490-5194