

혈행장애개선제 셀파원포르테 연질캡슐

셀파원포르테 연질캡슐은 우리몸에 꼭 필요한 비타민A, C, E와 셀레늄을 이상적으로 배합한 제제로 생체기능활성에 도움을 주며 말초혈행장애 및 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증 등의 갱년기 증상을 완화시켜 줍니다. 또한 눈과 피부건강을 지켜주어 정신적, 육체적 체력소모가 심한 수험생, 직장인 등의 영양제로도 효과적입니다.

【원료약품 및 분량】 1캡슐(730mg) 중

셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 60μg)(KPC)	111.11mg
아스코르브산(KP)	50.00mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서 100IU)(KP)	100.00mg
레티놀팔미테이트(비타민 A로서 2000IU)(KP)	1.18mg
감마오리자놀(KPC)	5.00mg
0.1% 시아노코발라민(시아노코발라민으로서 4.0μg)(KPC)	4.00mg
푸로셀티아민(KPC)	25.00mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호

【성상】 미황색의 내용물을 함유한 진한 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 A, E, C, B₁₂의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 체력 저하시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다
 - 눈의 건조감 완화, 야맹증
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화
 - : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증
 - 다음증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통 (요통, 건통 등)
 - 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 1일 1~2회, 1회 1캡슐을 식후 복용

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 IU/일이상 투여하지 않는다.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장·순환기계 기능 장애환자
 - 5) 신장에 환자
 - 6) 저단백혈증환자
 - 7) 위장관 질환

4. 이상반응

- 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 묽은변, 구내염
 - 피부염, 멍·호흡시 악취, 탈모, 조급증
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 에스트로젠을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고용량 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 콜산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10ug이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 대량투여로 인한 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조용법의 용량은 1일 5,000 IU이상을 넘지 않도록 한다.

6. 상호작용

- 항알도스테론제, 트리암테네가 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - : 인산염, 갈슘염, 경우용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취 한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민 A결핍증을 목적으로 이 약을 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상검사치에의 영향 : 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 덜 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【포장단위】 90캡슐, 180캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 소비자상담실 : 02-568-0051 · 반품 및 교환처 : 02-2244-1578

설명서 작성일 : 2008. 12