


※사용전에 사용설명서를 숙지 하시고 의약품과 함께 보관 하십시오.



황산콘드로이틴나트륨 300mg 함유 콘티아민 연질캡슐

일반의약품
분류번호: 316
KGMP 제품

【원료약품 및 그분량】 1캡슐중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	300mg
푸르셀티아민(KPC)	15mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg
시아노코발라민(KP)	30ug
토코페롤 아세테이트(KP) (비타민 E로서 50IU)	50mg
감마오리자놀(KPC)	5mg
첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호	

【성상】 황색의 내용물이 충전된 주황색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민(E, B1, B2, B6)의 보급:
육체피로, 임신·수유기 병중·병후의 체력저하시, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화:
어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등),
구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
- 각기 - 눈의 피로

【용법·용량】 성인 및 8세 이상의 어린이: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 3개월 미만의 영아
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오
(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부, 수유부
3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사
이상 환자 또는 지질생 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
3. 이상반응
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용
을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오: 위부 불쾌
감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염, 식
욕 부진, 복부팽만감
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이
점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는
혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전
증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면
감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계
의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10ug 이상 투여
할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.

- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손
상 (glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사
하는 능력 장애), 과산화혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산
이 과잉으로 존재하는 상태) 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사
또는 약사와 상의하십시오
- 3) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여
하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을
투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될
경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이
약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그
지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않습니다.

- 1) 레보도파
6. 임상검사치에의 영향
요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있
습니다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에
밀전하여 보관하십시오
3) 오용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에
넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 60, 120캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이
경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발
견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제
품에 관한 문의는 전화(02554-2839)로 하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭
(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 등정보」를
참조하세요.

- 제조의뢰자: 청계제약(주) - 경기도 화성시 양감면 대양리
1106-4
- 제조자: (주)동구제약 - 경기도 화성시 향남면 상신리 901-3
- 판매자: (주)대웅생명과학 - 서울 강동구 성내1동 469-6

