

집중력 장애 · 혈액순환장애 개선

기빅플로정 은행엽엑스120mg



일반의약품 / 분류번호 : 02190

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

- **기빅플로정**은 혈관내피세포유래이완인자(Endothelium-derived relaxing factor:EDRF)의 활성을 증가시켜 말초혈관을 확장시켜주므로 혈액순환장애를 개선시켜 줍니다
- **기빅플로정**은 혈액의 응집인자인 혈소판활성인자(Platelet activating factor : PAF)에 대한 길항작용(억제작용)으로 혈액의 점도를 낮추어 주므로 혈액순환이 원활하게 됩니다
- **기빅플로정**은 보행시 아프고, 두통이 있고, 떨리고 저린 증상이 나타나지만 쉬면 낫는 증상, 일명 파행증(절뚝거림)을 효과적으로 치료해줍니다
- **기빅플로정**은 유해한 유리기(Free radical)를 포획하고 지질의 과산화를 방지하는 항산화제로 작용, 신경대사 및 혈류개선을 통해 기억력, 집중력을 강화시킬뿐 아니라 치매성 증상을 수반하는 뇌기능장애의 개선에 효과적입니다

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

은행엽엑스(생규) 120.0mg
(총깁고플라본배당체로서 28.8mg)

첨가제(타르색소) 청색1호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크

동물유래성분 : 유당수화물 기원동물 : 소, 사용부위 : 우유

【성 상】 녹색의 원형 필름코팅정제

【효능 · 효과】

1. 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
3. 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애

【용법 · 용량】

· 성인

1. 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) :
은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구 투여한다(먹는다, 복용한다).
2. 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여한다(먹는다, 복용한다). 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증이 있는 환자.
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용 : 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움 • 가려움증
3. 일반적 주의 : 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 말 것.
4. 임부에 대한 투여 : 동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여 : 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 말 것.
6. 저장상의 주의사항
직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 막아)하여 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **【사용기간】** 제조일로부터 36개월 **【포장단위】** 100정, 200정

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하시거나 화일약품(주)(02-564-2722)로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마시기 바랍니다.

제 조 : **hwail** 화일약품주식회사
HWAIL PHARM.CO.,LTD
의뢰자 : 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 156

제조자 : **Arlico**
알리코제약(주)
충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

판매원 : **일양약품주식회사**
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동)

작성년월일 : 2009. 04. 22

개정년월일 : 2017. 06. 16

GFT1706.11
DW-17-06