

항산화제+미네랄+비타민 · 은가죽 종합 영양제

비타액티브®

연질캡슐

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

현대약품 비타액티브연질캡슐은 우리 몸에 필수적인 13종의 비타민과 7종의 미네랄이 들어 있는 고단위 종합영양제입니다. 비타액티브연질캡슐은 대표적인 항산화 성분인 유비데카레논(코엔자임큐텐), 셀레늄, 비타민 A, C, E, 아연 등이 함유되어 체내에서 유해한 작용을 하는 활성산소를 효과적으로 제거해 주어, 그 외 각종 비타민과 미네랄 성분이 이상적으로 배합되어 유체피로와 체력저하를 자주 느끼시는 현대인의 건강관리에 도움을 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,380mg) 중

셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 50μg)(별규)	38,462mg
베타카로틴30%연액(베타카로틴으로서 6mg)(KPC)	20.00mg
아스코르빈산(KP)	100.00mg
토코페콜아세테이트(비타민E로서 200IU)(KP)	200.00mg
유비데카레논(KP)	5.00mg
푸로실티아민(KPC)	6.00mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6.00mg
피리독신염산염(KP)	3.00mg
판토텐산칼슘(KP)	20.00mg
니코틴산아미드(KP)	20.00mg
폴산(KP)	0.40mg
콜레칼시페롤(유상형)(비타민D)로서 400IU(BP)	0.40mg
0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서 4.9μg)(KPC)	4.9mg
비오틴(USP)	0.045mg
감마오리자놀(KPC)	5.00mg
무수인산수소칼슘(KP)	60.00mg
(인으로서 13.66mg, 칼슘으로서 17.67mg, 총 칼슘으로서 19.36mg)	
푸마르산철(철로서 24mg)(KP)	73.00mg
산화아연(아연으로서 4.02mg)(KP)	5.00mg
무수황산동(구리로서 0.5mg)(EP)	1,255mg
황산망간(망간으로서 0.65mg)(USP)	2.00mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 6.03mg)(KP)	10.00mg
천가제(타르색소)	황색5호, 적색40호, 청색1호

【성상】 적색의 내용물을 함유한 알칼제의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민A, B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급
 - 육체피로 - 수유기 - 병중 - 병후의 체력저하 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화
 - : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증
 - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방 - 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】 성인 1일 1회, 1회1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경 고
 - 1) 임부나 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)
 - 2) 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정증, 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 12개월 미만의 영아
 - 4) 월경시범
 - 5) 혈액소중(혈대사 이상으로 혈이 간장, 폐장을 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
 - 6) 신장질환
 - 7) 중증의 신부전 환자
 - 8) 임부

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
- 3) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 수유부
- 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 6) 심장 - 순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장에 환자
- 8) 저단백혈증 환자
- 9) 감시배양제를 투여 중인 환자 10) 담낭관련 질환, 간질환 환자 11) 위장관 질환

4. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - ① 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종
 - ② 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 붉은변, 구내염
 - ③ 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴얼아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진
 - ④ 두드러기, 광선과민증, 복부·위 통증, 경련, 혼수, 열, 상복부통증
 - ⑤ 피부염, 발 - 호습시 악취, 탈모, 조급증, 흥분, 부전수축, 중추신경계기능저하
 - ⑥ 위장관 장애, 소화 장애, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경우를 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에서 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
6. 상호작용
 - 1) 할랄도스테론제, 트리아미테논과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - ① 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - ② 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄산음료를 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
7. 임부·수유부에 대한 투여
 - 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다. 역학조사 결과와 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 공으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만을 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
8. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60, 120캡슐

【사용기한】 제조일로부터 24개월

- * 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 오용을 막고, 품질을 보호·유지하기 위해서 다른 용기에 넣지 마십시오.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 투여함으로써 일례로 기형발현, 발적, 가려움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- * 이 제품에 대한 문고는 구입제나 사용설명서에 표시된 제품 문외처로 문의하십시오.
- * 이 사용설명서 개정년월(2009년 1월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundalpharm.co.kr)나 제품문외처(☎080-024-5525)에서 확인하실 수 있습니다.

제품문의처 : 080-024-5525
사용설명서 개정년월 : 2009. 01