

KGMP 적격업체제품

전문 의약품

분류번호 : 214

발데사르플러
스정
160/125mg
(발사르탄 · 히드로클로로티아지드)

【원료약품 및 그 분량】1정 중 발사르탄(USP) 160mg 히드로클로로티아지드(KP) 12.50mg 첨가제(타르색소) : 적색40 알루미눔레이크

【성 상】어두운 적색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】단일요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않은 본태고 혈압

【용법·용량】

- 성인:권장용량은 발사르탄 80mg/히드로클로로티아지드 125mg 1일 1회 1정이며 식사와 상관없이 복용할 수 있으며 소량의 물로 복용한다. 발사르탄 160mg/히드로클로로티아지드 125mg은 혈압강하를 위해 발사르탄 160mg/히드로클로로티아지드125mg으로 처방 받은 경우에 적용한다. 혈압강하효과는 2~4주 이후 최대효과를 나타낸다.
 - 신장애: 경중~중증도의 신장애 환자(크레아티닌청소율 30mL/min 이하에 대한 용량조절은 필요하지 않다.
 - 간장애: 환자·담즙정체가 없는 경중~중등도 간장애 환자에서는 발사르탄으로서 1일 80mg을 초과하여 사용하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에게 레난-인지오오텐신 알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수 십례가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다 (임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 성분아미드계 약물에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조)

3) 발사르탄은 다음과 같은 경우 금기이다. 중증의 간장애, 담즙성 간경변, 담도폐쇄·담즙 배반성 환자

4) 히드로클로로티아지드는 다음과 같은 경우 금기이다.

(1) 중증 신장애 환자(크레아티닌청소율 30mL/min 미만)

(2) 급성신부전 환자 (신기능의 약화가 나타날 수 있다)

(3) 칼륨보존성 증가시키는 상태에, 염·수소실 신장병증, 신전성(pre-renal, 심인성) 신기능장애 환자

(4) 치료불응성 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 고칼슘증 및 중증성 고요산혈증(통풍 또는 요산 및 병력이 있는 환자)을 치료중인 환자 또는 체액 중 나트륨·칼륨이 병백히 감소한 환자(저나트륨혈증, 저칼륨혈증 등 전해질 실효를 악화시킬 수 있다)

(4) 치료되지 않은 애 디나 병 및 리튬 병용 치료중인 환자(9) 당뇨병 환자 또는 투석중인 환자(이 약의 효과를 기대할 수 없다)

5) 유전성 혈관부종을 앓고 있거나, 과거에 ACE억제제나 인지오오텐신Ⅱ수용체 길항제를 복용하여 혈관부종이 발생한 환자

6) 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애환자 (사구체여과율(60mL/min/1.73m²)에서 알라스키인 환유제제와 병용 3) 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 전해질의 변화

2) 환자

3) 나트륨 및/또는 체액 결핍

4) 신장애 환자

5) 전신성 홍반성 루푸스 환자

6) 급성 폐쇄적 녹내장 환자

7) 뇌혈관장애 환자(과도한 혈압강하가 혈류부전을 야기하여 상태를 악화시킬 수 있다)

8) 염분 제한요법(low-salt therapy) 중인 환자(저나트륨혈증을 일으킬 수 있다)

9) 중증 관상화장 또는 뇌동맥경화증 환자(급격한 이뇨가 나타날 수)을 경유 급속한 혈장량 감소, 혈액응축을 초래하여 혈전색전증을 유발할 수 있다.

10) 빈뇨에 당뇨병 또는 부로, 혈전에 통풍, 당뇨병 또는 고요산혈증이 있는 환자(고요산혈증, 고혈당증을 초래하여 통풍, 당뇨병의 악화나 현상화할 수 있다)

11) 설사, 구토가 있는 환자(전해질 실효가 나타날 수 있다)

12) 부갑상선기능항진증 환자(혈청 칼슘을 상승시킬 수 있다)

13) 디기탈리스, 부신피질호르몬제 또는 ACTH를 투여 중인 환자(이 약의 혈압강하 작용을 증가시킬 수 있다)

14) 고칼슘혈증에 환자(이 약의 혈압강하작용이 증강될 수 있다)

15) 고령자

16) 심부전 또는 심근경색 후 환자

17) 신기능이 레난-인지오오텐신-알도스테론계(RAAS)의 활성에 의존하는 환자(예, 중증의 심부전환자에게 인지오오텐신-전환효소 억제제(ACE억제제) 또는 인지오오텐신 수용체 길항제(APB)의 투여는 소변감소 등 크고/또는 진정성 고혈압을 일으킬 수 있다)

18) 급성 심부전 그리고/또는 사망과 관련 있다. 심부전은 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 한다.

17) 레난-인지오오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 인지오오텐신 수용체 길항제(APB), ACE 억제제 또는 알리스키렌 등 레난-인지오오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 이상반응

1) 발사르탄-히드로클로로티아지드 복합제 (1) 4300명 이상의 환자에서 이 약의 안전성을 평가하였다. 이상반응은 대개 일시적이고 경증이었다. 다음 이상반응 표는 총 7616명의 환자에 이 약 투여 환자 수 : 472명에 대해 시행한 3개의 대조임상 시험을 바탕으로 한 것이다. 이 약에서 발생한 이상반응 발생률은 위약에 의한 유사했다. 이 약에서 1% 또는 그 이상의 발생율을 보여 모든 이상반응은 시험약과의 인과관계에 상관없이 다음 표에 포함시켰다.

구 분	이 약* (N = 4372), %	위약(N = 262), %
두통	3.7	14.5
어지럼	3.5	3.8
비인두염(Nasopharyngitis)	2.4	1.9
피로	1.6	1.5
요통	1.2	2.7
기침	1.2	0.8
상부호흡기감염	1.2	3.4
설사	1.1	1.1
관절통	1.0	1.1

* 발사르탄 80mg, 160mg, 320mg과 히드로클로로티아지드 125mg, 25mg 또는 조합을 포함.

(2) 기타 : 1% 미만의 이상반응은 복통, 상복부통, 시야흐림, 시각이상, 불안, 관절염, 기관지염, 급성기관지염, 가슴통증, 기립성 어지럼, 구강 건조, 소화불량, 호흡곤란, 발기부전, 위장장애, 다한증, 감각저해, 불면, 저칼륨혈증, 저혈압, 인플루엔자, 근육경직, 근염자, 구역, 비종혈, 비강 출혈, 목의 통증, 종이염, 사지통, 이상감각, 인두부종증, 발열, 부비동염, 발열, 부비동염, 졸음, 다기관염, 빈뇨, 두근 거림, 발진, 인대염좌, 실신, 빈혈, 이명, 요로감염, 바이러스 감염, 부비, 말초부종, 무력증, 어지럼 등이있으며 이 약과의 인과관계는 밝혀지지 않았다. (3) 국외 시판 후 조사결과 다음과 같은 이상반응이 매우 드물게 나타났다: 혈관부종, 발진, 가려움, 혈청병과 관련음을 포함한 기타 과민반응/알레르기 반응, 고칼륨혈증, 탈모, 신기능 손상, 근육통, 두통, 피부자진과 폐포막의 IgG 축적이 동반되는 히드로클로로티아지드 유도성 폐부종이 여러 건 보고된 바 있다. 바-심인성 폐부종은 히드로클로로티아지드에 대해 드물게 나타난다 면역학적 특이 반응으로 나타날 수 있다. (4) 국외 (일본)에서 실시한 임상시험에서 발사르탄-히드로클로로티아지드 복합제를 투여한 환자에서 이상반응이 보고된 것은 666례 중 286례(43.9%)이며 중대한 이상반응은 다음과 같다.
① 아나필락시모양 증상(빈도불명): 아나필락시모양 증상을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
② 혈관부종(빈도불명): 얼굴, 입술, 인두, 혀의 부어오름 등의 증상이 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
③ 간염(빈도불명): 간염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
④ 신부전(빈도불명): 신부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑤ 고칼륨혈증(빈도불명): 중증 고칼륨혈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투

여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑥ 저나트륨혈증(빈도불명): 권태감, 식욕부진, 구역, 구토, 의식장애 등을 동반하는 저나트륨혈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다(고령자에게 나타날기 쉽다).
⑦ 소금, 실신, 의식상실(모두 빈도불명): 소금, 혈압저하에 따르는 실신, 의식상실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히 엄격한 염분 제한요법, 혈압강하 이뇨제의 투여 중인 환자에서는 환자의 상태를 충분히 관찰해야 한다.
⑧ 무과립구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소(모두 빈도불명): 무과립구증, 백혈구 감소, 혈소판감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑨ 재생불량성빈혈, 골혈성빈혈(모두 빈도불명): 중증의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑩ 과사성혈관염(빈도불명): 과사성혈관염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타 내는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑪ 독성표피과사용 해(리얼증후군)(빈도불명): 독성표피과사용해(리얼증후군) 가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑫ 간질성페렴(빈도불명): 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선이상 등을 동반한 간질성페렴이 나타날 수 있으므로 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 부신피질호르몬제의 투여등 적절한 처치를 한다.
⑬ 폐수종(빈도불명): 폐수종이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑭ 전신 홍반성 루푸스의 악화(빈도불명): 전신 홍반성 루푸스를 악화시킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑮ 저혈당(빈도불명): 저혈당이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 혈력감, 공복감, 식욕없, 손의 떨림, 집중력 저하, 경련, 의식장애 등이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다(당뇨병자 등) 중의 환자에서 나타날기 쉽다).
⑯ 횡문근융해증(빈도불명): 근육통, 탈락감, 크레아티닌나아제(CK) 상승, 혈관 또는 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑰ 국내 시판 후 조사결과 국내에서 재발사를 위하여 6년 동안 725명을 대상으로 실시한 시판 후 사용 성적조사결과 이상반응의 발현분류율은 인과관계와 상관없이 262%(192/725)로 보고되었다. 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.79% (13례/725례)이다. 두통, AST상승, 어지럼, 두근거림, 소화불량(각 0.28%(2례)), 부종, 무력, 고중성지방혈증, 크레아티닌가아제(CK) 증가, 기침(이 0.14%(1례)로 나타났다. 시판 전 임상시험에서 나타지 않았던 새로운 이상반응으로 크레아티닌가아제 증가가 보고되었다. 2) 발사르탄 단독투여시 다음과 같은 이상 반응이 보고되었다.
(1) 혈액 및 림프계: 빈도불명 해모클로빈 및 헤마토크리트의 감소, 혈소판 감소증
(2) 면역: 빈도불명 혈청병을 포함한 기타 과민성/알러지 반응
(3) 대사 및 영양: 빈도불명 혈청 칼륨 증가, 저나트륨혈증
(4) 귀 및 미로: 흔하지 않게 현기증(verigo)
(5) 혈관: 빈도불명 혈관염
(6) 위장관: 흔하지 않게 복통
(7) 간 및 담도: 빈도불명 기이한 수치 상승
(8) 피부 및 피하조직: 빈도불명 혈관부종, 발진, 가려움, 수포성 피부암
(9) 신장 및 비뇨기: 빈도불명 신부전 이 약과의 인과관계와 상관 없이 임상시험 동안에 다음과 같은 증상이 보고되었다: 관절통, 무력, 요통, 설사, 어지럼, 두통, 불면, 성욕감퇴, 구역, 부종, 인두염, 비염, 부비동염, 삼기조감염, 바이러스 감염
(3) 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제를 단독으로 투여시 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.
(1) 전해질 및 대사성 이상: 매우 자주(특히 고용량에서) 저칼륨혈증, 혈중 지질 상승, 자주 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증 및 고요산혈증, 드물게 고칼슘혈증, 매우 드물게 저염소혈증 알칼리증(이 나타날 수 있다, 포도당 내성을 변경시킬 수 있고, 혈청 콜레스테롤, 중성지방 및 요산 수치의 증가를 일으킬 수 있다. 드물게 고혈당증, 당뇨병, 당뇨병자의 악화가 나타날 수 있다 (신중투여할 것)).
(2) 피부: 자주 두드러기 및 다른 종류의 피부발진, 드물게 광민성반응, 매우 드물게 과사성 혈관염 및 독성표피과사용해(리얼증후군), 피부 홍반성 루푸스모양 반응, 피부 홍반성 루푸스의 재발
(3) 소화기계: 자주 식욕부진, 경증의 구역, 구토, 드물게 복부불편감, 변비, 설사, 위장장애, 불면감, 매우 드물게 체장염
(4) 간: 드물게 간담 담즙정체 또는 황달
(5) 순환기계: 자주 기립저혈압(알코올, 마취제 또는 진정제에 의해 악화될 수 있다), 드물게 심장 부정맥
(6) 중추신경계: 감각소실 또는 진정, 드물게 두통, 어지럼, 수면장애, 우울증, 이상감각
(7) 감각기관: 드물게 시각장애(치료 첫 주에 주로 나타날 수 있다)
(8) 혈액계: 드물게 심방박동 이상(때때로 자반을 동반), 매우 드물게 백혈구감소증, 무과립구증, 골수기능부전, 용혈성 빈혈
(9) 기타: 자주 발기부전, 매우 드물게 과민성 반응, 폐렴, 폐부종을 포함한 호흡 곤란
(10) 국외 시판 후 경험으로 부타의 약물 유효 반응(빈도불명): 급성 심부전, 신장애, 재생불량성 빈혈, 다형 홍반, 발열, 근육연축, 무력, 급성 폐쇄적 녹내장

5. 일반적 주의

1) 운전과 기계조작 수행에 대한 이 약의 효과에 대한 연구는 없으나 운전 또는 기계조작을 할때 어지럼 또는 졸음이 나타날 수 있다는 것을 고려해야 한다.
2) 중상성 저혈압: 이 약을 투여 받는 환자에게 특히, 치료 첫 수일 동안 어지럼이 발생할 수도 있다는 주의사항을 설명하고, 어지럼 발생 시 약을 사용해서는 안 된다.
3) 티아지드계 이뇨제는 새름게 저칼륨혈증을 발생시키거나 기존의 저칼륨혈증을 악화시킬 수 있다. 칼륨 저하가 심해진 환자(예, 염소실 신장병증 및 신전성 (prerenal, 심인성) 신기능장애 환자)에게 티아지드 이뇨제 투여시 주의하여야 한다. 저칼륨혈증이 임상증상(예, 근육약화, 복원전미비, 또는 심전도변화)을 동반하는 경우, 이 약의 투여는 중지되어야 한다. 티아지드계 이뇨제는 저칼륨혈증 및 동반된 저마그네슘혈증이 있을 경우 교정치료 후에 투여하는 것이 권장된다. 칼륨 및 마그네슘의 혈중 농도는 정기적으로 확인해야 한다. 티아지드계 이뇨제를 투여 받 는 모든 환자는 전해질, 특히 칼륨의 불균형을 모니터링 하여야 한다. 티아지드계 이뇨제는 저나트륨혈증 및 저염소성 알칼리증을 새름게 발생시키거나 기존의 저나트륨혈증을 악화시킬 수 있다. 신경계 증상(구역, 진행성 방광감각상실, 무력증)이 동반된 저나트륨혈증이 개별 사례로 관찰된 바 있다. 혈청 나트륨 농도의 정기 모니터링이 권장된다.
6) 고혈당의 이뇨제 투여로 중증의 나트륨 결핍 및/또는 체액결핍 이 나타난 환자의 경우 이 약 투여 초기에 드물게 중상성 저혈압이 나타날 수 있다. 따라서 반드시 나트륨 및 체액결핍상태를 보정한 후 이 약을 투여하고, 그렇지 못한 경우는 의료전문가 감시하에 투여하도록 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 빈번한 자세로 놓고고 필요 하다면 생리식염 주사액을 점적주입한다. 혈압이 안정된 후 약물투여를 계속한다.
7) 경중~중등도 신장애 환자(크레아티닌청소율≥30mL/min)에게 투여 시 용량조절은 필요하지 않다. 이 약은 히드로클로로티아지드를 함유하기 때문에 중증의 신장애 환자(크레아티닌청소율 <30mL/min)에게 이 약은 금기이다. 티아지드계 이뇨제는 만성 신장 질환 환자에게 질소혈증을 유발할 수 있다. 이 약을 신장애 환자에 사용할 경우 혈청 칼륨, 크레아티닌 및 요산 레벨의 정기적인 모니터링이 권장된다.
8) 신이식 환자: 최근 신이식을 한 환자에서 이 약의 사용에 대한 안전성 자료는 없으나 경중~중등도 신장애 환자에게 이 약 투여 시 용량 조절은 필요하지 않다. 발사르탄으로서 1일 80mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 간기능 장애 또는 진행성 간 질환이 있는 환자의 경우, 체액 및 전해질 균형에 약간의 모니터링을 간성 환수를 일으킬 수 있기 때문에, 티아지드계 이뇨제는 주의하여 사용해야 한다.
10) 티아지드계 이뇨제는 전신성 홍반성 루푸스를 일으키거나 악화시킬 수 있다.
11) 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제는 포도당 내성을 변경시킬 수 있고 혈청 콜레스테롤 및 트라글리세라이드의 증가를 일으킬 수 있다. 다른 이뇨제와 마찬가지로 히드로클로 로티아지드는 요산의 청소율을 감소시켜 혈청 요산의 수치를 증가시킬 수 있으며 고요산혈증을 유발 또는 악화시키며 감수성이 있는 환자에게 통증을 발생시킬 수 있다. 당뇨병 환자에 신 인슐린 또는 경구혈당강화제의 용량 조절이 필요할 수 있다. 티아지드계 이뇨제는 칼슘 대사에 이상이 없는 경우에도 오 중 칼슘 배설을 감소시켜 혈청칼슘 농도를 약간 상승시킬 수 있다. 히드로클로로티아지드는 혈청 칼슘 농도를 증가시킬 수 있기 때문에 고칼슘혈증 환자에게 투여 시 주의해야 한다. 티아지드계 이뇨제의 투여 중지 에 불응하거나 또는 12mg/dL 이상의 혈청 칼슘을 보 보이는 경우는 티아지드계 이뇨제와 무관한 다른 원인에 의한 고칼슘혈증일

수 있다. 지속적으로 티아지드계 이뇨제 치료를 받은 몇몇 환자에서 고칼슘혈증 및 저인산혈증과 함께 부갑상선의 병리적 변화가 관찰된 바 있다. 고칼슘혈증이 발생하면 부갑상선 기능검사가 필요하다. 티아지드계 이뇨제는 부갑상선 기능검사를 시행하기 전 투여를 중단해야 한다. 티아지드계 이뇨제는 갑상선 장애의 징후 없이 혈청 단백 결합 요소도 수치를 감소시킬 수 있다.
12) 광민감증: 티아지드계 이뇨제에서 광민감증의 사례가 보고되었다. 치료도중 광민감반응이 나타날 경우 치료를 중단하는 것이 권장된다. 티아지드계 이뇨제의 재투여가 필요할 경우 햇빛 또는 인공 UVA 자외선 권장된다.
13) 히드로클로로티아지드, 설펜아미드는 급성 일과성 근시 및 급성 폐쇄 각 녹내장을 유발한다. 시력 저하 또는 눈의 통증이 급성으로 시작되고 전형적으로 투여 개시 후 수 시간에서 수 주 이내에 발생한다. 설펜아미드 또는 페니실린 알레르기의 병력이 급성 폐쇄각 녹내장을 발생시키는 위험 요인이 될 수 있다. 급성 폐쇄각 녹내장을 치료하지 않으면 영구적인 실명 손실이 될 수 있다. 일차 치료는 가능한 한 빨리 히드로클로로티아지드의 투여를 중지하는 것이다. 만약 안압이 조절되지 않는다면 즉각적인 약물 또는 외과적 처치를 고려할 필요가 있다.
6. 상호작용

1) 발사르탄/히드로클로로티아지드에 의해 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있다.
(1) 리튬: 리튬제제와 ACE 억제제, 인지오오텐신수용체 길항제 또는 티아지드계 이뇨제를 병용투여 할 경우, 혈청 리튬 농도 및 리튬 독성의 가역적 증가가 보고되었다. 티아지드계 이뇨제는 리튬의 신청소율을 감소시키기 때문에 이 약으로 인한 리튬 독성이 나타날 위험이 증가할 수도 있다. 이 약과 리튬의 병용투여는 권장되지 않으며 의사의 엄격한 감독하에서만 병용투여 되어야 한다. 리튬의 병용투여가 꼭 필요한 경우에는 병용투여 기간 동안 리튬의 혈청농도를 모니터링하는 것이 권장된다.
2) 발사르탄에 의해 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있다.
(1) 발사르탄의 단독 투여 시 다음 약물과의 임상적으로 유의한 상호작용은 관찰되지 않았다. : 시메티딘, 와르파린, 푸로세미드, 디곡신, 아테놀롤, 인도메타신, 히드로클로로티아지드, 알모디핀, 글리벤클라미드
(2) 칼륨: 칼륨보존 이뇨제, 칼륨보존제 및 칼륨유용 염류제나 혈청 칼륨수치를 변화시킬 수 있는 다른 약물(예, 헤파린)과의 병용은 권장하지 않는다.
(3) 비스테로이드 소염진통제(NSAID): 인지오오텐신수용체 길항제와 NSAIDs에, 항염증소법으로 아스피린 COX-2차해제)와 동시에 투여되었을 때 혈고혈압 효과 가 감소할 수 있다. 특히 노인환자, 체액이 부족한 환자(이뇨제 투여한 후 환), 또는 신장기능이 저하되었 있는 환자의 경우 신장기능 악화의 위험성을 증가시킬 수 있다. 그러므로 NSAIDs를 투여하고 있는 환자에게 발사르탄 투여를 시작하거나 투여 방법을 변경할 때에는 신장기능에 모니터링이 권장된다.
(4) 발사르탄은 유의한 수준까지 대사되지 않기 때문에, 임상적으로 CYP450호소계의 대사이유도는 대사자에게 의한 약물간 상호작용은 나타나지 않을 것으로 예상된다. 발사르탄은 혈청 단백질과 강하게 결합함에도 불구하고, 생체와 실험에서 디클로페낙, 푸로세미드 및 와르파린과 같이, 단백질과 강하게 결합하는 일련의 분자와 이 수준에서 어떠한 상호작용도 나타나지 않았다.
(5) 전달제(transporters) 사람의 간 조직을 가지고 한 in vitro 연구 결과에서 발사르탄이 간 흡수 전달제 OATP1B1과 간 유출 전달제 MRP2의 기질임을 보여 주었다. 흡수 전달제 저해제(리튬피신, 사이클로스포린) 또는 유출 전달제 억제제(리토나비라)와 병용투여는 발사르탄의 전신 노출을 증가시킬 수 있다.
(6) 인지오오텐신수용체 길항제(APB), ACE억제제, 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레난-인지오오텐신계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물의 단독효과와 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중등중~중증의 신장애 환자(사구체 여과율 60mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스키렌 함유제제를 병용투여하지 않는다.
3) 이 약의 주성분 중 하나인 티아지드계 이뇨제로 인하여 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있다.
(1) NSAIDs 및 COX-2 선택적 차단제 : NSAIDs에, 살리실산 유도제, 인도메타신과 같은 병용투여는 티아지드계 이뇨제의 이뇨작용과 항고혈압 효과를 악화시킬 수 있다. 항병증으로 저혈량증이 있을 경우 급성 신부전증이 나타날 수 있다.
(2) 혈청 칼륨 수치에 영향을 미치는 약물: 이뇨제의 저칼륨혈증 작용은 칼륨 배설을 이뇨제(예, 푸로세미드), 코르티코스테로이드, ACTH, 양포데리신, 카르베네콜, 페니실린G 및 살리실산 유도제 또는 항부정맥제와의 병용 투여에 의해 증가될 수 있다.
(3) 이온교환수지 : 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 흡수는 콜레스티라민 및 콜레스티롤로 인해 감소된다.
(4) 골격근 이완제: 티아지드계 이뇨제는 류마티스 유도제와 같은 골격근 이완제의 작용을 강화시킬 수 있다.
(5) 당뇨병증: 티아지드계 이뇨제는 포도당의 내성을 변화시킬 수 있으므로 인슐린이나 경구용 당뇨병약의 용량 조정이 필요할 수 있다. 히드로클로로티아지드로 인한 기능성 신부전 유발 시 메트포르민의 병용투여로 젯산산증(lactic acidosis)위험이 나타날 수 있기 때문에 주의하여 병용 투여하여야 한다.
(6) 이안타민: 티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 병용 투여는 아만타딘에 의한 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있다.
(7) 항콜린성 약물: 티아지드계 이뇨제의 생체이용률은 항콜린성 약물(예, 아트로핀, 비페리덴)과의 병용으로도 증가될 수 있으며 이것은 위장관계 운동이 감소되고 위배출시간이 느려지기 때문이다. 반대로 시아프리드와 같은 위장운동 촉진제는 티아지드계 이뇨제의 생체이용률을 감소시킬 수 있다.
(8) 메틸도파 : 메틸도파와 히드로클로로티아지드의 병용시 용혈성 빈혈이 보고된 바 있다.
(9) 히타딘 D: 티아지드계 이뇨제는 히타딘 D 또는 칼슘염과 병용시 혈청 칼슘 수치를 증가시킬 수 있다.
(10) 시를로소포린 : 시를로소포린과의 병용은 고요산혈증과 통풍증(quart-type) 합병증의 위험을 증가시킬 수 있다.
(11) 알코올, 바르비트레이트 또는 마약 : 알코올, 바르비트레이트 또는 마약과의 병용 투여는 기립저혈압의 발생을 증가시킬 수 있다.
(12) 혈당상승 이인류: 히드로클로로티아지드는 노르아드레날린과 같은 순압 아민류의 반응을 감소시킬 수 있다. 그러나 임상적 유의성은 명확하지 않고, 혈당상승 아민류의 사용을 제한할 정도로 나타나지 않았다.
(13) 디기탈리스 배양제: 티아지드계 이뇨제로 인한 저칼륨혈증 또는 저마그네슘혈증은 디기탈리스로 인한 심장부정맥을 더 쉽게 유발시킨다.
(14) 혈청 나트륨 수치에 영향을 미치는 약물: 히드로클로로티아지드와 카르바마제핀을 병용투여하는 환자에서 저나트륨혈증이 발현할 수 있다. 따라서 이러한 환자들에게 저나트륨혈증 발현의 가능성에 대하여 알려주어야 하며 적절한 모니터링을 하여야 한다.
(15) 다른 항고혈압 약물: 티아지드계 이뇨제는 다른 항고혈압약물(예, 구아네티딘, 메틸도파, 베타차단제, 혈관이완제, 칼슘채널차단제, ACE억제제, 인지오오텐신Ⅱ수용체 길항제 및 직접적 레닌 차단제(ARB))와 고혈혈압 증상을 증가시킨다.
(16) 알로 푸리놀: 티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 병용 투여는 알로푸리놀에 대한 과민반응 발생률을 증가시킬 수 있다.
(17) 항 중양약제, 시를로포스피리드, 메트토크사티를 : 티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 병용 투여는 세포독성약물들의 신장 배설을 감소시킬 수 있으므로 골수억제 효과를 강화시킬 수 있다.
(18) 칼슘염류: 티아지드계 이뇨제의 병용투여는 세포관에서 칼슘 재흡수를 증가시켜 고칼슘혈증을 유발할 수 있다.
(19) 디아지옥시드 및 베타차단제: 티아지드계 이뇨제는 디아지옥시드의 고혈당 효과를 증가시킬 수 있다. 베타차단제와 티아지드계 이뇨제와의 병용은 고혈당 위험을 증가시킬 수 있다.
(20) 오도조염제: 이뇨제에 기인한 탈수 및의 경우, 특히 고용량의 오도조 염제를 병용하였을 때 급성 신부전의 위험이 증가된다. 투여 전 재수화(hydration) 해야 한다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 인지오오텐신수용체 길항제의 작용기전 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없다. 임신 2~371 사이에 ACE억제제(레난-인지오오텐신-알도스테론계(RAAS)에 작용하는 특정 약물군)에 노출된 임부에서 태아발달손상 및 사망을 일으킨다는 보고가 있다. 또한 후향적 자료에 의한, 임신 1기에 ACE억제제를 사용한 것은 출생전기의 잠재적 위험과 관련 있었다. 태아의 신장관류는 임신 27에 형성되며, 레난 인지오오텐신 시스템의 발달을 받기 때문에 임신 2, 37에 발사르탄을 복용하면 위험이 증가한다. 임신 2~371 동안 레난-인지오오텐신계에 직접 작용하는 약물의 사용은 저혈압, 신생아 두개골 저형성증, 무능증, 가역적 또는 비가역적 신부전, 및 사망을 포함한 태아 및 신생아의 손상과 관련이 있는 것으로 나타났다. 양수과소증이 보고된 바 있으며, 양수과소증은 태아 시가지구증, 두개관협 기형, 및 폐 발육부전 등과 관련이 있는 것으로 나타났다. 약물노출과의 관련성이 명확하지 않으나,

미숙아 출산, 자궁내 발육 부전 및 동맥관 개존증이 또한 보고되었다. 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 자궁 노출 시 태아 또는 신생아의 황달, 혈소판감소증이 유발될 수 있고 성인에서 나타나는 다른 이상반응도 일어날 수 있다. 임부가 우발적으로 발사르탄을 복용했을 때 자연 유산, 양수과소증, 신생아 신기능 이상이 나타났다는 보고가 있었다. 자궁 내에서 약물에 노출되었던 모든 신생아에 대해서는 배조작용, 고칼륨혈증, 그리고 혈압을 검사한다. 필요한 경우에는, 순환계에 녹아있는 약물을 없애기 위한 의학적 조치를 취한다. 다른 레난-인지오오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물처럼 이 약도 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에서 사용해서는 안되며, 투약 중 임신이 확인되면 즉시 투약을 중지한다. 드물게(1,000명의 임부 당 1명 미만에서) 레난-인지오오텐신계에 작용하는 대체 약물을 찾지 못할 수 있다. 이러한 경우에 레난-인지오오텐신-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신 가능성이 있는 여성에게 처방하는 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려 주어야 하며 양수 내 혈청을 평가하기 위해 지속적인 초음파 검사를 시행하여야 한다. 양수과소증이 관찰되면 임부의 생명을 구하기 위한 것을 제외하고는 이 약을 중단하여야 한다. 임신 주수에 따라 수축 자극 검사(Contraction stress test: CST), 무자극검사(nonstress test: NST), 또는 생물이학적 프로파일(biophysical profiling: BPP) 검사가 적절할 수 있다. 그러나 환자와 의사는 태아가 이미 비가역적인 손상이 발생한 이후에도 양수과소증이 나타나지 않을 수 있다는 것을 인식하고 있어야 한다. 자궁속에서 인지오오텐신수용체 길항제에 노출된 적이 있는 유아는 저혈압, 핏뇨, 및 고칼륨혈증이 있는지 면밀히 관찰되어야 한다. 핏뇨가 있다면, 혈압 및 신장관류 유지에 주의를 기울여야 한다. 저혈압을 회복시키고 신기능을 대신하기 위해 교환수혈이나 투석이 필요할 수도 있다. 발사르탄이 사람에게 모두 중에 이행되는지의 여부는 밝혀지지 않았으나 랫드에 대한 시험에서 모두 중에 발사르탄의 분비가 확인되었다. 히드로클로로티아지드는 태반을 통과하고 사람에서도 모두로 이행된다. 따라서 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 3) 사람의 생식능에 대한 발사르탄 또는 히드로클로로티아지드의 효과에 대한 정보는 없다. 이 약에서 생식능에 대한 정보는 없지만, 발사르탄 및 히드로클로로티아지드 각각의 성분으로 수행한 비임상시험에서 생식능에 대한 영향은 나타나지 않았다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약의 비교 임상시험에서 고령군과 비교령군 사이에 발사르탄-히드로클로로티아지드의 유효성 및 안전성에 대한 전반적인 차이는 관찰되지 않았다.

10. 임상검사항지의 영향

1) 이 약을 투여받은 환자의 3.7%, 위약환자의 3.1%에서 20% 이상의 혈청 칼륨 감소가 나타났다(신중투여할 참조). 2) 다음 결과가 발사르탄 단일요법에서 나타났다. 이 약 투여시에는 결과가 없었다. : 드물게 해모클로빈 및 헤마토크리트 수치 감소가 나타났다. 3) 대조임상시험 결과 헤마토크리트 및 해모글로빈의 유의적인 감소(203%)인 감소가 각각 0.8%, 0.4% 나타났다. 반면 위약의 경우 모두 0.1%가 감소했다. 4) 대조임상시험 결과 혈청 크레아틴, 칼륨 및 총 칼슘리튬의 농도의 유의적인 증가가 발사르탄으로 환자 간의 경우 0.8%, 4.4%, 6.0%였고 ACE 억제제의 경우 1.8%, 6.4%, 12.9%였다. 또한 대조임상시험에서 이 약 투여군에서는 1.6%의 간담과 BUN 상승이 각각 1.9%, 14.7% 나타났다. 위약 투여군에서는 각각 0.4%와 6.3% 나타났다. 5) 때때로 발사르탄의 투여로 간기능 검사치의 상승이 보고되었다. 6) 이 약을 투여하는 본태고혈압 환자에 대해 특별한 임상검사항지의 모니터링을 필요한 정도는 아니다. 7) 호중구감소증은 이 약을 투여받은 환자의 0.1%에서, 위약을 투여받은 환자의 0.4%에서 관찰되었다.

11. 과량투여시의 처치

1) 사람에 대한 과량 투여 관련 데이터는 제한적이다. 과량투여로 나타나기 쉬운 증상은 저혈압과 빈맥이다. : 발사르탄의 과량투여는 현저한 저혈압을 일으킬 수 있고, 이는 의식저하, 순환성 허탈 및 쇼크로 나타날 수 있다. 복용 직후이면 구토를 유도하고, 그 외에는 생리식염 주사액을 정맥 내에 주입한다. 2) 히드로클로로티아지드의 과량투여로 다음과 같은 증상이 나타날 수 있다: 구역, 졸음, 저혈량증, 부종액과 관련된 전해질 이상, 근육경직, 과량투여 이후 시간, 증상이 나 중상의 정도에 따라 조치해야 한다. 순환안정화의 회복이 가장 중요하다. 만일 복용 직후이면 구토를 유도하고, 복용 후 시간이 많이 경과했다면 적당한 양의 활성탄을 투여한다. 3) 저혈압의 경우 환자를 빈듯이 놓고고 가능한 한 빨리 혈장대체를 한다. 발사르탄은 혈장단백과의 강한 결합 때문에 혈액투석으로는 제거되지 않으나 히드로클로로티아지드는 투석으로 제거될 수 있다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 습기를 피하여 보관한다. 3) 의약품 용량 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

13. 기타

여러 종의 동물용 이용한 발사르탄, 히드로클로로티아지드, 발사르탄/히드로클로로티아지드의 전임상 안전성시험에서, 전신 또는 특정 장기에 대한 독성의 증거는 없었다. 발사르탄/히드로클로로티아지드(100/31.25~600/187.5mg/kg)의 고용량은 랫트에서 적절할 시점 수치(혈구, 해모글로빈, 헤마토크리트)를 감소시켰으며, 신장의 혈액학을 변화시켰다(중등도 내지 중증의 혈중 요소 증가, 혈중 칼륨 및 마그네슘의 증가, 경증의 요양 및 전해질 증가, 약간의 세포관 호염기구증가증, 최고 용량에서 수임 소염백반(afferent anterior hypertrophy) 비대), 마모셋에서(30 : 9375~400 : 125mg/kg), 빈혈은 상당히 유사하게 나타났다. 중증의 양상을 나타냈다. 특히 고용량의 경우 신장에서 신병증이 나타났으며, 이는 요소와 크레아티닌 증가를 포함하였다. 신 방사구체 세포(renal tubuloglomerular cell)의 비대 또한 두 종에서 관찰되었다. 모든 변화는 발사르탄/히드로클로로티아지드의 독성적인(부가적이지) 보단, 발사르탄 단독에 비해 약 10배 상승) 약리 작용에 의한 것으로 간주되며, 특히 마모셋에서 오랫동안 저혈압이 나타났으며, 발사르탄-히드로클로로티아지드의 치료용량은 사람에서 임상사구체세포 비대에 관련하지 않을 것으로 보인다. 주요 전임상 안전성 결과는 상용성으로 작용하는 것으로 보이는 약물의 약리작용에 의한 것이며, 두 약물간의 다른 상호작용의 증거는 없다. 임상시험에서, 두 약물의 작용은 부가적이었으며, 전임상 결과는 임상적 의미를 나타내지 않았다. 발사르탄/히드로클로로티아지드는 상호작용의 증거가 없었으며, 이에 병용으로 돌연변이 유발, 염색체 이상, 또는 발암성을 시험하지는 않았다. 그러나 발사르탄과 히드로클로로티아지드는 각각 돌연변이 유발, 염색체 이상, 발암성 시험을 하였으며, 모두 음성결과를 나타냈다.

【저장방법】기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】30, 90정

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 본 의약품은 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 대표전화: (02)2672-1122 제품문의:080-665-1414
※ 홈페이지: www.guju.co.kr

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서 권(http://drug.mids.go.kr/) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.
※ 제조사: 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

설명서 문안 작성 연월일 : 2017. 2. 27

1-1701



GUJU 구주제약