

※의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 급·만성 위염 ▶ 신경성 위염 ▶ 속쓰림
▶ 위하수, 소화불량 ▶ 식욕부진 ▶ 구역·구토 ▶ 숙취

원료약품의 분량 : 1포(3.0g) 중

반 하(KP)	1.67g
황 금(KP)	1.00g
건 강(KP)	0.83g
인 삼(KP)	1.00g

감 초(KP)	1.00g
대 추(KP)	1.00g
황련(KP)	0.33g
이상수침연조엑스 2.50g	
동물유래성분(유당수화물 / 소 / 우유)	

성 상 : 황갈색의 과립제

효능·효과 : 영치가 답답하고, 때때로 구역, 구토가 있고, 식욕부진(식욕감퇴)하며, 배에서 소리가 나고, 묽은 변 또는 설사 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 급·만성 위장카타르, 발효설사, 소화불량, 위하수(위저침), 신경성 위염, 위장하역, 속취, 트림, 속쓰림, 구내염(입안염), 신경과민

용법·용량 : 보통 성인 1회 1포(3.0g)를 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용(사용)한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것. 1) 신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 고혈압 환자 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 5) 고령자(노인) 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감령(줄임)하는 등 주의할 것. 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용(사용)에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용(사용)량이 감소해서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용(사용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용(사용)을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용(사용)을 중지할 것. (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등 (4) 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달 등(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) (5) 간질성폐렴 : 발열, 기침, 숨찬 호흡곤란 등 2) 1개월(급성 위장카타르, 속취, 트림, 속쓰림에 복용(사용)할 경우에는 5~6회) 정도 복용(사용)하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항 1) 장기간 계속하여 복용(사용)하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용(사용)할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 3) 칼륨함유제제, 갑조함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용(사용)할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용(사용)할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.
- 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 60포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시거나 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2014. 12. 09

제조사

한솔신약(주)

Hansol Pharm. Co., Ltd. 총책 음성군 공평읍 2-11도림리 (33-33)

HS : 080210