

조인스탐 (연질캡슐)

콘드로이틴설페이트나트륨300mg 함유

【원료약품 및 그 분량】1연질캡슐 중

콘드로이틴설페이트나트륨(KPC)	300mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
푸로셀라민(KPC)	50mg
시아노코발라민(KP)	30μg
γ-오리자놀(KPC)	5mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
토코페롤아세테이트(KP)	50mg
(비타민D로서 50IU)	

첨가제(식약청인정타르색소) : 적색 40호, 황색 5호
젤라틴(기원 : 소, 사육부위 : 가죽)

【성상】황색의 내용물이 충전(채움)된 적색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민(E, B₁, B₂, B₆)의 보급 :
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
2. 말초혈행장애 및 경년비 시 다음 증상의 완화 :
어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
3. 다음 증상의 완화 :
신경통, 근육통, 관절통(오히려)통, 건통, (어깨결림) 등) 구각염(입
꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
4. 각기
5. 눈의 피로

【용법·용량】성인 및 만 8세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게 투여하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의
하십시오)
1) 만 1세 미만의 영아(갓난아기)
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 임부, 수유부
4) 고지단백혈중, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이)염 등 지방대사
이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자
3. 이상반응
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지
하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
:위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토,
붉은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부위)팽만감
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아
질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는
혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우
혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경
병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는

병적 변화)이 나타날 수 있습니다.

- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈
액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고당량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성)
손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는
능력 장애), 과요 산혈증(hyperursemia : 혈액중에 요산이 과잉으로
존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사
와 상의합니다.
3) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여하십시오.
4) 자발과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때
혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외
배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절
합니다. 환자가 다른 정주용(정맥주사용) 지질제를 동시에 투여받고
있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여
지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))
투여하지 않습니다.

1) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

노(소)변을 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여
(뚜껑을 꼭 닫아)보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른
용기에 넣지 않습니다.

【포장단위】60캡슐, 120캡슐

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

‘본제품의 상세 정보는 이지드렉(ezdrug.kda.go.kr) 의약품 정보 참조’

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를
의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일
유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신
약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에
의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 유효성명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드렉(<http://ezdrug.kda.go.kr>→
정보마당→의약품등 정보를 참조하세요.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지
(www.arico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해
확인할 수 있습니다.

작성 연월일 : 2011. 08. 08

【제 조 자】(주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

【제조의뢰자】알리코제약(주)충북 진천군 광혜원면 화죽리 160-17

【판 매 자】  일약약품주식회사
경기도 용인시 기흥구 하늘빌 182-4

【소비자 상담실】080-585-0004

S112145/01