

말초혈액순환 개선 · 기질성 뇌장애 치료에-

진코맥신^{120mg} 정

은행엽엑스

일반의약품
분류번호 219

진코맥신정은 말초 혈관의 혈행을 개선하고 혈소판 응집, 혈관운동 기능을 조절¹ 하여 말초동맥순환장애, 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)에 치료효과를 나타내는 은행잎 추출물 주성분의 천연생약제제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1정 중

은행엽엑스(KHP) 120mg

■ 성상 : 황색의 장방형 필름코팅정

■ 효능 · 효과 :

1. 주요능 효과

- 1) 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 질뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움등의 치매증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

■ 용법 · 용량 :

성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구 투여한다(복용한다).
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다(복용한다).

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항 :

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당 성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 기력유증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 30정, 300정

■ 첨부문서최종개정일 : 2015년 05월 27일

■ 참고문헌

1. Wei Zhou, Clinical Use and Molecular Mechanisms of Action of Extract of Ginkgo biloba Leaves in Cardiovascular Diseases, *Cardiovascular Drug Reviews* 2004;22(4):309-319

※ 본 의약품은 우수 의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

15-7-20

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의, 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10