

펜디에프정

(펜디메트라진타르타르산염)

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 펜디메트라진타르타르산염(USP) 35mg
- 첨가제(동등유래) : 루디프래스 중 우당수화물(소·우유)
- 기타첨가제 : 루디프래스, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

■ 성상

흰색의 원형정제

■ 용법 · 용량

적절한 체중감량요법(식이요법 및/또는 운동요법)에 반응하지 않는 초기 체질량지수(Body Mass index : BMI)가 30 kg/m² 이상 또는 비만 위험인자(예, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증)가 있는 BMI 27 kg/m² 이상인 비만 환자에서 칼로리 제한을 기본으로 하는 위안성 비만 치료 시 체중감량 요법의 단기간 보조요법, 이 약은 다른 식욕억제제와 병용하지 않고 단독으로만 사용해야 한다. 아래는 다양한 키와 체중에 근거한 체질량지수표이다. 체질량지수는 환자의 체중(kg)을 환자의 키(m)의 제곱으로 나누어 계산된다.

표 1. 체질량지수(BMI, kg/m²)

체중(kg)	키(cm)						
	150	160	170	175	180	185	190
60	26.7	23.4	20.8	19.6	18.5	17.5	16.6
65	28.9	25.4	22.5	21.2	20.1	19.0	18.0
70	31.1	27.3	24.3	22.9	21.6	20.5	19.4
75	33.3	29.3	26.0	24.5	23.1	21.9	20.8
80	35.6	31.3	27.7	26.1	24.7	23.4	22.2
85	37.8	33.2	29.4	27.8	26.2	24.8	23.5
90	40.0	35.2	31.1	29.4	27.8	26.3	24.9
95	42.2	37.1	32.9	31.0	29.3	27.8	26.3
100	44.4	39.1	34.6	32.7	30.9	29.2	27.7
105	46.7	41.0	36.6	35.9	34.0	32.1	30.5
110	48.9	43.0	38.1	35.9	34.0	32.1	30.5
120	53.3	46.9	41.5	39.2	37.0	35.1	33.2

■ 용법 · 용량

성인 : 펜디메트라진타르타르산염으로서 1회 35 mg을 1일 2 ~ 3회 식사 1시간 전에 경구투여한다. 용량은 최소 유효 용량을 사용하여 적절한 반응을 얻을 수 있도록 개인별로 조정하여야 한다. 일부 환자에게는 1일 1회 17.5 mg 이 적절할 수도 있다. 용량은 1회 70 mg을 1일 3회를 초과하여 복용하면 안 된다. 이 약은 단기간(4주 이내) 동안 투여한다. 단, 이 약의 부적절한 사용과 위험을 줄이기 위해서 환자가 첫 4주 이내에 만족할 만한 체중감량을 얻었을 경우(최소 1.8 kg 이상 체중 감량)가 있거나 환자와 환자 모두 만족할만한 체중 감량이 있다고 판단하였을 때에는 이 약으로 치료를 지속할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

- 경고
 - 이 약은 전문의약품, 일반의약품, 생약제제를 포함하여 다른 식욕억제제와 병용투여시 중증 심질환이 발생할 수 있으므로 함께 사용하지 않는다. 이 약은 위안성 비만의 조절시 단독 요법으로 단기간 동안만 사용해야 한다. 선택적 세로토닌 재흡수 길항제(예, 플루옥세틴, 설토랄린, 플루복사민, 파록세틴)를 포함하여 체중감량을 목적으로 투여하는 다른 의약품과 이 약의 병용투여에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다. 따라서 이 약과 체중감량을 목적으로 하는 다른 약물과의 병용은 권장되지 않는다.
 - 원발성 폐동맥 고혈압(Primary Pulmonary Hypertension : PPH) : 한 외국의 역학연구에서 이 약을 포함한 식욕억제제의 투여가 치명적인 폐동맥 고혈압의 위험성 증가와 더불어 관련이 있었다. 3개월 이상의 식욕억제제 투여는 폐동맥 고혈압 위험의 23배 증가와 관련이 있었다. 반복된 약물치료로 인한 폐동맥 고혈압 위험 증가를 배제할 수 없다. 운동조율공간의 발현 또는 악화, 또는 예측되지 않았던 협심증 증상, 실신 또는 하지 말단 부종은 폐동맥 고혈압의 발현 가능성을 암시한다. 이 경우, 이 약의 투여를 즉시 중지하고, 발생 가능한 폐동맥 고혈압의 유무에 대하여 평가해야 한다.
 - 판막심장병(Valvular heart disease) : 판막심장병은 판플루아민, 맥스플루아민 같은 식욕억제제와 관련이 있으며 판막심장병이 발생할 수 있는 보조 위험인자로써 약물의 장기간 투여, 권장용량을 초과하는 용량 또는 다른 식욕억제제와의 병용이 있다. 이 약과 판막심장병과의 관련 가능성은 배제할 수 없지만 이 약을 단독으로 투여했던 환자에서 판막심장병은 거의 보고되지 않았다. 판막심장병 및 폐동맥 고혈압과 같은 가능한 중대한 유해민증의 잠재적 위험성은 체중 감소의 잠재적 유익성과 비교하여 신중하게 평가되어야 한다. 이 약 투여를 시작하기 전에 기증의 판막심장병 또는 폐동맥 고혈압을 진단할 수 있도록 투여 전 심장 평가를 고려해야 한다. 이 약은 알려진 심장장음(murmur) 또는 판막심장병이 있는 환자에게는 권장되지 않는다. 이 약을 투여하는 동안 및 투여 후에 심장초음파상을 찍는 것은 발생할 수 있는 판막 질환을 진단하는데 유용하게 쓰일 수 있다.

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 교감신경 흥분성 아민류에 과민하거나 투제제민한 환자
 - 진전된 동맥경화증 환자
 - 중추성 심혈관계 질환 환자
 - 폐동맥 고혈압 환자를 포함하는 중증도 ~ 중증의 고혈압 환자
 - 갑상샘 항진 환자
 - 뇌내장 환자
 - 정신적으로 매우 불안하거나 흥분상태에 있는 환자
 - 약물 남용의 병력이 있는 환자
 - 다른 중추신경계 흥분제를 복용하고 있는 환자 또는 MAO억제제 복용 후 14일이 경과하지 않은 환자(혈압상승의 위험을 유발한다.)
 - 다른 식욕억제제를 복용하고 있는 환자(중증의 심질환이 발생할 수 있다.)
 - 심장잡음(murmur) 또는 판막심장병이 있는 환자
 - 16세 이하의 소아
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency), 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 경증의 고혈압 환자
 - 수유부
 - 당뇨병 환자
- 이상반응
 - 심혈관계 : 심계항진, 빈맥, 혈압상승
 - 중추신경계 : 과자극작용, 불안감, 어지럼, 불면증, 진전, 도취감, 두통, 드물게 신경 용양에서 정신장애, 흥분, 혼조, 발한, 시야흐림
 - 소화기계 : 구갈, 불쾌감, 설사, 변비, 기타 소화기 장애(구역, 위통)

- 비노생식기 : 성적충동의 변화, 빈뇨, 요결핍, 발가부진
- 과민반응 : 두드러기
- 일반적 주의
 - 식욕억제 효과의 내성은 통상적으로 수주일 이내에 나타난다. 식욕억제 효과에 대한 내성이 나타났을 경우에는 용량을 증가시키지 말고, 이 약의 사용을 중지해야 한다.
 - 이 약은 중추신경계에 작용하므로 기계운전이나 자동차 운전 등의 위험한 활동에 종사하고 있는 사람들에게는 주의하여 투여해야 한다.
 - 당뇨병 환자에게 이 약과 식이요법을 동시에 사용하면 인슐린 요구량이 변경될 수 있으므로 인슐린 의존성 진성 당뇨병 환자에게 식이요법과 병행하여 이 약을 투여할 경우 인슐린 투여량을 조절하여야 한다.
 - 과량투여의 가능성을 최소화하기 위해 가능한 한 번에 최소 용량을 처방하거나 조제해야 한다.
 - 이 약은 최근 1년 이내에 다른 식욕억제제를 사용한 환자에게는 투여가 권장되지 않으므로 주의한다.
 - 이 약을 오랫동안 고용량으로 투여한 후 갑작스럽게 투여를 중지할 경우 극도의 피로나 우울증을 초래할 수 있다.
- 상호작용
 - 이 약의 투여로 구아네티딘의 혈압강화 효과를 저하시킬 수 있다.
 - 오의 산성화는 이 약의 배설을 증가시킨다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 그러나 일부의 체중 감소는 임부에게 잠재적 유독성을 제공하지 않고 태아에게 해를 입힐 수 있다. 이 사의 판단에 의해 이 약의 투여로 인한 잠재적 유독성이 잠재적인 위험성을 상회하지 않는 한 더 많은 정보가 뒷받침될 때까지 이 약은 임신하거나 임신할 계획하고 있는 여성에게 투여되어서는 안 된다.
 - 이 약을 투여 시 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다. 많은 약물이 사람의 모유로 이행되므로 이 약을 수유부에 투여할 경우 주의해야 한다.

- 상호작용
 - 이 약의 투여로 구아네티딘의 혈압강화 효과를 저하시킬 수 있다.
 - 오의 산성화는 이 약의 배설을 증가시킨다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 그러나 일부의 체중 감소는 임부에게 잠재적 유독성을 제공하지 않고 태아에게 해를 입힐 수 있다. 이 사의 판단에 의해 이 약의 투여로 인한 잠재적 유독성이 잠재적인 위험성을 상회하지 않는 한 더 많은 정보가 뒷받침될 때까지 이 약은 임신하거나 임신할 계획하고 있는 여성에게 투여되어서는 안 된다.
 - 이 약을 투여 시 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다. 많은 약물이 사람의 모유로 이행되므로 이 약을 수유부에 투여할 경우 주의해야 한다.
- 소아에 대한 투여
 - 16세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.
- 과량투여시의 처리
 - 중상
 - 급속한 과량투여의 증상으로 발한, 혼수, 진전, 반사항진, 호흡축진, 혼란, 환각, 공격성, 공황상태가 나타날 수 있으며, 치명적인 중독 시 경련, 혼수상태 및 사망을 초래할 수 있다. 중추신경계 흥분 후 극심한 피로와 우울증이 동반된다.
 - 심혈관계 : 부정맥, 고혈압, 저혈압 및 순환계 허탈
 - 소화기계 : 구역, 구토, 설사 및 복부 경련
 - 처리
 - 과량투여시의 처리는 주로 대증적이며, 바르비탈류를 투여하는 진정작용을 포함한다.
 - 급격한 혈압 상승 시에는 질산염 또는 신속 작용성 알파차단제 투여를 고려해야 한다. 이 경우 혈액투석 또는 복막 투석은 권장되지 않는다.

- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 기타
 - 의존성 : 이 약은 마약류관리에관한법률 및 마약류관리에관한법률시행령에 의하여 마약류로 지정되어있는 약물이다. 이 약은 화학적 및 약리학적으로 알페타민류와 연관되어 있다. 알페타민류 및 관련 흥분성 약물들은 남용성을 가지며, 이 약의 남용 가능성은 체중 감량 프로그램의 일부로서 의존성 약물치료의 필요성을 평가할 때 고려되어야 한다.
 - 알페타민류와 관련 흥분성 약물들은 강력한 정신적 의존성 및 심각한 사회적 기능장애와 연관될 수 있다.
 - 이 약을 고용량으로 장기간 투여 후 갑작스럽게 중단할 경우 극도의 피로와 정신적 우울증, 수면 EEG변화를 초래한다.
 - 이 약으로 인한 만성 중독 증상은는 중증의 피부병, 불면, 자극과민성, 기능항진, 성격의 변화 등이 있고, 가장 심각한 증상으로는 정신분열증과 유사한 정신이상성이 나타난다.
 - 발암성, 변이원성, 생식독성
 - 이 약의 발암성 가능성, 변이원성 가능성, 생식력에 미치는 영향에 대한 평가는 수행되지 않았다.

■ 포장단위
30정/병, 300정/병
■ 저장방법
기밀용기, 실온(1~30℃)보관
■ 첨부문서 작성연월일
2022.10.11 이 첨부문서 작성연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(http://www.jw-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
■ 교환 및 제품문의

본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설회에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주시십시오. 연락처 : 고객 만족팀 1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담)

본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

항정신성의약품 식욕억제제 안전사용을 위한 환자용 안내서



본 안내서는 항정신성의약품 식욕억제제를 복용하시는 환자분께 해당 약제의 복용 전 주의사항에 대해 알려드리고자 배포되었습니다. 이 약 복용 전 내용을 숙지하고 이 약과 관련해 중요 사항들은 환자 스스로가 충분히 이해하여셔야 합니다. * 본 자료는 'www.nims.or.kr > 자료실'에 공지되어 있으니 비만환자의 항정신성의약품 식욕억제제 처방 시 활용하시기 바랍니다.

1. 이 약은 어떤 약입니까?

다음 식욕억제제들은 <마약류 관리에 관한 법률>에 의하여 마약류로 지정되어 있는 약물입니다.

펜티민, 펜디메트라진, 디에틸프로피온, 마진돌

일명 ‘실백’은 약이라고 불리는 제품 중 상기 4가지 성분을 주성분으로 하는 의약품은 배가 고프지 않거나 또는 배가 부르다고 느껴 음식을 덜먹게 하는 의약품입니다. 이런 의약품들은 **약물 의존성이 있어서 전제계적으로 마약류도 관리**하고 있습니다.

2. 이 약은 어떤 경우에 처방받아 복용할 수 있습니까?

식이요법이나 운동요법만으로 효과가 없는 경우, 체질량지수가 다음과 같다면 의사와 상담하여 식욕억제제를 단기간 보조요법으로 치료를 시작할 수 있습니다.

- BMI(체질량지수, kg/m²)가 30을 넘는 경우
- 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 증상이 있는 환자의 경우 BMI가 27을 넘는 경우

3. 이 약은 어떻게 복용해야 합니까?

- 복용기간
 - 식욕억제제의 복용기간은 실이 빠지는지, 다른 부작용이 없는지에 따라 달라지나, 항정신성의약품 식욕억제제는 4주 이내 복용하도록 하고 있습니다. 의사에 판단에 따라 조금 더 복용할 수도 있으나, **3개월을 넘길 경우 심각한 부작용(폐동맥고혈압, 중증 심장질환 등이) 발생할 수 있습니다.**
- 복용 시 주의사항
 - 다른 식욕억제제와 병용투여 시 중증 심질환이 발생할 수 있으므로 함께 사용하면 안되며 단독으로 복용해야 합니다.
 - 식욕억제제는 반복해서 복용하는 경우 약물 의존성이 발생할 수 있으며 약물을 갑자기 중단하거나 복용량이 한지하게 줄어드는 경우 금단현상이 나타날 수 있습니다. 그렇기 때문에 복용량을 임의로 늘리거나 갑작스럽게 복용을 중단해서는 안되며, 반드시 의사선생님이 처방해주신 용법 · 용량대로만 복용하여야 합니다.
 - 임신을 한 경우에는 이 약을 복용해서는 안됩니다. 이 약을 복용하기 전 임신을 계획하고 있거나 임신 가능성이 있으면서 경우 의사에게 반드시 알려주십시오. 임신 중에 이 약을 복용했거나, 이 약 복용 중에 임신하신 경우 복용을 즉시 중단하십시오. 의사와 상의하셔야 합니다.
 - 이 약을 포함한 많은 약물이 사람의 모유로 이행되므로 수유 중인 여성은 이 약을 복용해서는 안됩니다.
 - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하면 안됩니다 : 16세 이하 소아, 진전된 동맥경화증 환자, 심혈관계 질환 환자, 중증도 이상의 고혈압 환자, 폐동맥 고혈압 환자, 갑상선 기능 항진증 환자, 녹내장 환자, 정신적으로 불안하거나 흥분 상태인 환자, 약물 남용의 병력이 있는 환자

4. 이 약 복용 시 나타날 수 있는 부작용은 무엇입니까?

[주의 이상반응 정보]

- 항정신성 식욕억제제는 남용과 습관을 나타내며, 만성 중독 증상으로 정신분열증과 유사한 정신이상성이 나타남
 - 다른 식욕억제제와 병용투여시 중증 심질환이 발생할 수 있으므로 함께 사용하면 안됨
 - 3개월 이상의 식욕억제제 투여, 반복된 약물치료는 폐동맥 고혈압 위험을 상승시킴
 - 장기간 투여, 권장용량을 초과하는 용량, 다른 식욕억제제와의 병용은 판막심장병과 관련 가능성을 배제할 수 없음
 - 원발성 폐동맥 고혈압, 역류성 심장판막 질환, 심계항진, 빈맥, 혈압상승, 과자극작용, 불안감, 어지럼, 불면증, 도취감, 두통, 드물게 신경 용양에서 정신질환적 증상, 구갈, 불쾌한 맛, 설사, 변비, 기타 위장관 장애, 두드러기, 발가부진, 성격충동증후군의 이상반응 발생 가능
- 5. 항정신성의약품 식욕억제제의 안전하고 효과적인 사용을 위한 정보**
- 이 약은 의사의 처방에 의해서만 복용하십시오.
 - 이 약을 임의로 다른 사람에게 양도해서는 안됩니다.
 - 정해진 용법 · 용량을 준수하여 복용하십시오.
 - 이 약을 어딘가에 손에 닿지 않게 보관하십시오.
 - 이 안내서는 항정신성의약품 식욕억제제에 대한 가장 중요한 정보를 요약한 내용입니다. 더 많은 정보가 필요한 경우, 국내 제품설명서를 참고하시기나 의약품전문가와 상의하십시오.
 - 의약품을 판매 · 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하여 보관하십시오.
 - 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

귀하가 항정신성의약품 식욕억제제로 치료하는 중 오남용 또는 이상반응을 경험하는 경우에는 반드시 병 · 의원을 방문하여 의사와 상담하여 주십시오. 이상반응은 의약품 공급처(제이더블유신약) 또는 한국의약품안전관리원(http://www.drugsafe.or.kr) 또는 전화 1644-6223)에 알려주십시오.

본 안내서는 제이더블유신약 항정신성의약품 식욕억제제의 위해성 완화 조치방법의 일환으로 환자를 설명서를 배포하고 있으며 제이더블유신약 홈페이지(이제 시 아래 절차에 따라 다운로드 가능합니다). 또한 배포처에서는 본 안내서 소진 시 제이더블유신약(1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담))으로 문의하여 주시면 추가 공급하여 드립니다.

<안내서 다운로드> 제이더블유 신약 홈페이지(http://www.jw-shinyak.co.kr) > 제품 > 제품검색 > 의약품명 검색 > 제품 페이지 내 팝업 참조

항정신성의약품 식욕억제제 안전사용을 위한 전문가용 안내서

전문가용 안내서

본 안내서는 항정신성의약품 식욕억제제를 처방하시는 의사선생님께 본 제제의 오남용 예방 관련 정보를 제공하여, 보다 안전한 의약품 사용을 도모하고자 제작되었습니다. 본 지침서는 식품의약품안전처의 검토를 받았습니다.

· 항정신성의약품 식욕억제제 성분 정보

다음 식욕억제제들은 <마약류 관리에 관한 법률>에 의하여 마약류로 지정되어 있는 약물입니다.

펜티민, 펜디메트라진, 디에틸프로피온, 마진돌

- 적절한 체중감량요법(식이요법 및/또는 운동요법)에 반응하지 않는 초기 체질량지수(Body Mass Index: BMI)가 30kg/m² 이상 또는, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등 다른 위험인자가 있는 BMI 27kg/m² 이상인 위안성 비만 환자에서 운동, 행동 수정 및 칼로리제한을 기본으로 하는 감량요법의 단기간 보조요법으로 사용됨
- 이 약은 다른 식욕억제제와 병용하지 않고 단독으로만 사용해야 합니다.

· 항정신성의약품 식욕억제제 약물 중요 정보

1. 식욕억제제 성분 별 처방 · 사용 용량 및 기간은 아래와 같습니다.

펜티민, 펜디메트라진, 디에틸프로피온, 마진돌

- 처방량부터 시작하여 허가용량 내 최소 유효 용량을 사용하되 적절한 반응을 얻을 수 있도록 개인별로 용량을 조정하여 4주 이내 처방한다.
 - 다만, 4주 이내 단기처방 후 목표 체중 감량이 있었고 의사가 추가처방이 의학적으로 필요하다고 판단될 시는 재방가 후 허가된 복용량 범위내에서 중량하는 등 처방할 수 있으나, 원발성 폐동맥 고혈압 등 부작용 발생 위험을 고려하여 총 처방기간은 3개월을 넘기지 않습니다.
 - 다만, 허가용량 내 최대 용량으로 3개월 간 치료를 한 후에도 목표한 체중 감량에 도달하지 못하였을 경우, 약물치료의 위험성, 유용성 및 약물 순응도 등에 대한 재평가를 하여 약물의 투여종단을 또는 교체 여부를 판단한다.
- 2. 복용금지 등 주의사항은 다음과 같습니다.**
- 식욕억제제 전문의약품, 일반의약품, 생약제제를 포함하여 다른 식욕억제제와 병용하여서는 안됩니다.
 - 선택적 세로토닌 재흡수 길항제에 포함하여 체중감량을 목적으로 투여하는 다른 의약품과 안전성이 확립되어 있지 않아 병용은 권장하지 않습니다.
 - 어린이나 청소년은 비만 치료 시 식이요법, 운동요법 그리고 행동요법이 원칙으로 식욕억제제를 16세 이하 어린이 및 청소년에게 사용하지 않습니다.
 - 식욕억제제를 심혈관계 질환을 악화시킬 수 있으므로 심혈관 질환 병력이 있는 환자에게는 사용하지 않는 것이 바람직합니다.
 - 진전된 동맥경화증 환자, 중증도~중증의 고혈압 환자, 폐동맥 고혈압 환자, 갑상샘 항진 환자, 최근 14일 이내 노노아민 신화합제 억제제를 복용한 환자, 정신적으로 매우 불안 또는 흥분 상태의 환자, 교감 신경 흥분성 아민류에 과민하거나 특이체질인 환자, 약물남용의 병력이 있는 환자, 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성, 수유중인 여성에게는 사용하지 않습니다.

3. 알페타민류 및 관련 흥분성 약물들은 남용성을 가지며, 식욕억제제의 남용 가능성은 체중 감량 프로그램의 일부로서 의존성 약물치료의 필요성을 평가할 때 고려되어야 합니다.

· 오남용이 미치는 위험성

[보고된 식욕억제제 오남용 사례]

- 식욕억제제 8알을 한 번에 복용 이후 혼수상태로 현재 정신 병원으로 옮김
- 약에 대한 강한 의존성이 생겨 다른 사람 명의로 처방을 받기도 함
- 매일 식욕억제제 3정씩 복용 중, 약물 의존성으로 인하여 약물 중단 시 출혈이 심하고 일상 생활이 어려움

식욕억제제는 과량 투여 시 다음과 같은 증상을 나타낼 수 있습니다.

- 급속한 과량투여의 증상으로 발한, 혼수, 진전, 반사항진, 호흡축진, 혼란, 환각, 공격성, 공황장애가 나타날 수 있으며 치명적인 중독 시 경련, 혼수상태 및 사망을 초래.
 - 중추신경계 흥분 후 극심한 피로와 우울증이 동반
 - 심혈관계: 부정맥, 빈맥, 고혈압 또는 저혈압, 순환성 쇼크
 - 소화기계: 구역, 구토, 설사, 복통
- 식욕억제제는 만성 중독으로 다음과 같은 증상을 나타낼 수 있습니다.
- 중증의 피부병, 불면, 자극과민성, 기능항진, 성격의 변화 등
 - 정신분열증과 유사한 정신 이상

· 식욕억제제 안전성 확보를 위한 방안

식욕억제제는 화학적 및 약리학적으로 알페타민류와 연관이 있는 교감신경 작용제이므로, 처방 · 사용 시 아래 사항을 확인 · 관찰하는 것이 바람직합니다.

- 처방 · 사용 전에 심혈관계, 정신질환 과거력을 포함하여 동반 질환이나 약물 복용 이력을 확인한다.
- 복용 중 우울증과 불안, 불면증 등 기분 장애를 유발할 수 있고, 우울증 병력이 있는 환자의 경우 재발 위험이 높아질 수 있으므로 정신건강의학 상태를 면밀히 관찰한다.
- 최근 1년 이내에 식욕억제제를 사용한 환자에게는 투여가 권장되지 않으므로, 처방하기 전에 1년 이내 식욕억제제 사용 여부를 확인한다.

식욕억제제 처방 · 사용 시 아래 사항을 기록추적관리 하는 것이 바람직합니다.

- 비만 환자의 비만 관련 조치 신체 계측 결과(체중, 체질량지수, 허리둘레 등)
- 약물 복용 후 비만 관련 자료의 변화 및 신체 계측 결과
- 혈압 · 심박수 등 심장질환이나 뇌혈관 질환 관련 위험 인자 측정 결과
- 주요한 부작용 경험 여부

[환자에게 제공되어야 할 정보]

- 환자에게 식욕억제제의 의존성 및 남용성에 대해 안내해야 합니다.
- 환자에게 식욕억제제 과량 투여 시 위험성에 대해 안내해야 합니다.
- 환자에게 의약품용 타겟에 절대 양도하지 말아야 하며, 남은 약은 약사에게 반납하도록 안내합니다.
- 환자가 식욕억제제로 인한 부작용 발생 시 즉시 의사와 상담할 수 있도록 안내되어야 합니다.

귀하가 항정신성의약품 식욕억제제로 치료하는 중 오남용 또는 이상사례를 발견 된 경우에는 즉시 의약품 공급처(제이더블유신약) 또는 한국의약품안전관리원(http://www.drugsafe.or.kr) 또는 전화 1644-6223)에 보고하시기 바랍니다.

본 안내서는 제이더블유신약 항정신성의약품 식욕억제제의 위해성 완화 조치방법의 일환으로 전문가용 설명서를 배포하고 있으며, 제이더블유신약 홈페이지(이제 시 아래 절차에 따라 다운로드 가능합니다).

또한 배포처에서는 본 안내서 소진 시 제이더블유신약(1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담))으로 문의하여 주시면 추가 공급하여 드립니다.

<안내서 다운로드> 제이더블유 신약 홈페이지(http://www.jw-shinyak.co.kr) > 제품 > 제품검색 > 의약품명 검색 > 제품 페이지 내 팝업 참조

보고요언

날짜	2022년 10월 11일	기타	론타입	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 있습니다. 예) 이진 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이빈 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.
고객사	JW신약	 4원색 —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)		
제품명	펜디에프정			
유형	매뉴얼팩			
인쇄	변양면 □단면			
규격	138×385mm			
접지규격	35×35mm	폰트	- 제품명 : 7포인트 이상	
재질	캠퍼스지 50g		- 전문의약품 문구 : 7포인트 이상	
관리번호	75001		- 본문 : 6포인트	

>> 접지 후 모습



· 롤 폴림방향 (미출) →