

발사르텔플러스정

80/12.5mg, 160/12.5mg

【원료약품의 분량】1정 중

발사르텔플러스정80/12.5mg：발사르탄(USP) 80.0mg, 히드로클로로티아지드(USP) 12.5mg, 첨가제(타르색소)：적색40호, 청색2호

발사르텔플러스정160/12.5mg：발사르탄(USP) 160.0mg, 히드로클로로티아지드(USP) 12.5mg, 첨가제(타르색소)：적색40호

【성상】 발사르텔플러스정80/12.5mg：밝은 오렌지색의 타원형 필름코팅정

발사르텔플러스정160/12.5mg：어두운 적색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

단일요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않은 본태고혈압

【용법·용량】

○ 성인

권장용량은 발사르탄 80mg/히드로클로로티아지드 12.5mg 1일 1회 1정이며 식사와 상관없이 복용할 수 있으며 소량의 물로 복용한다. 발사르탄 160mg/히드로클로로티아지드 12.5mg는 혈압강하를 위해 발사르탄 160mg/히드로클로로티아지드 12.5mg으로 처방 받은 경우에 적용한다. 혈압강화효과는 2~4주 이후 최대효과를 나타낸다.

○ 신장애 환자

경증~중등도의 신장애 환자(크레아티닌청소율 30mL/min 이상)에 대한 용량조절은 필요하지 않다.

○ 신장애 환자

담즙정체가 없는 경증~중등도 간장애 환자에서는 발사르탄으로서 1일 80mg을 초과하여 사용하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
입부에게 레닌-안지오텐신 시스템에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수습 계가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다.(입부 및 수유부에 대한 투여 항 참조)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 설콘아미드계 약물에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성임부 및 수유부에 대한 투여항 참조
- 발사르탄은 다음과 같은 경우 금기이다.
 - 중증의 간장애, 담즙성 간경변, 담도폐쇄·담즙반분지정 환자
- 히드로클로로티아지드는 다음과 같은 경우 금기이다.
 - (1) 중증 신장애 환자(크레아티닌청소율 30mL/min 미만) 또는 급성신부전 환자(신기능의 약화가 나타날 수 있다.)
 - (2) 칼륨소실을 증가시키는 상태(예, 염소소실 신장병증), 신전성증(prerenal, 심인성) 신기능장애 환자
 - (3) 치료불응성 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 고칼슘증 및 중증성 고요산혈증(통증 또는 요산 및 병력이 있는 환자)을 치료중인 환자 또는 체액 중 나트륨·칼륨이 명백히 감소한 환자(저나트륨혈증, 저칼륨혈증 등 전해질 실조를 악화시킬 수 있다.)
 - (4) 치료되지 않은 애디슨 병 및 리튬 병용 치료중인 환자
 - (5) 무뇨증 환자 또는 투석중인 환자(이 약의 효과는 기대할 수 없다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 전체혈의 변화 환자
 - 나트륨 및/또는 체액 결핍 환자
- 간장애 환자
 - 전신성 홍반성 루푸스 환자
- 니혈관장애 환자(과도한 혈압강하가 뇌혈류부전을 야기하여 상태를 악화시킬 수 있다.)
- 감염요법 중인 환자(저나트륨혈증을 일으킬 수 있다.)
- 중증 관상화증 또는 뇌동맥경화증 환자(급격한 이뇨가 나타났을 경우 급속한 혈장량 감소, 혈액 농축을 초래하여 혈전색전증을 유발할 수 있다.)
- 보인예 당뇨병 또는 부모 형제에 통풍, 당뇨병 또는 고요산혈증이 있는 환자(고요산혈증, 고혈당증을 초래하여 통풍, 당뇨병의 악화나 현상화할 수 있다.)
- 신사, 구토가 있는 환자(전해질 실조가 나타날 수 있다.)
- 부갑상선기능항진증 환자(혈청 칼슘을 상승시킬 수 있다.)
- 디기탈리스, 부신피질호르몬제 또는 ACTH를 투여 중인 환자(이 약의 혈압강하 작용을 증강시킬 수 있다.)
- 고칼슘신경절제 후 환자(이 약의 혈압강하작용이 증강될 수 있다.)
- 고령자

4. 이상반응

1) 발사르탄-히드로클로로티아지드 복합제

(2) 4,300명 이상의 환자에서 이 약의 안전성을 평가하였다. 이상반응은 대개 일시적이고 경증이었다. 다음 이상반응을 표는 총 7,616명의 환자(이 약 투여 환자수 4,372명)에 대해 시행한 3개의 대조임상시험을 바탕으로 한 것이다. 이 약에서 발생한 이상반응 발생률은 위약에서와 유사하다. 이 약에서 1% 또는 그 이상의 발생률을 보인 모든 이상반응은 시험약과의 인과관계에 상관없이 다음 표에 포함시켰다.

구 분	이 약*(n = 4,372), %	위약(n = 282), %
두통	3.7	14.5
어지럼	3.5	3.8
비인두염(Nasopharyngitis)	2.4	1.9
피로	1.6	1.5
오통	1.2	2.7
기침	1.2	0.8
상부호흡기감염	1.2	3.4
설사	1.1	1.1
관절통	1.0	1.1

* 발사르탄 80mg, 160mg, 320mg과 히드로클로로티아지드 12.5mg, 25mg의 모든 조합을 포함

- 기타：1% 미만의 이상반응은 복통, 상복부통, 시야흐림, 시각이상, 불안, 관절염, 기관지염, 급성기관지염, 가슴통증, 기림성 어지럼, 구강건조, 소화불량, 호흡곤란, 발기부전, 위장장애, 다한증, 감각저하, 불면, 저칼륨혈증, 저혈압, 인슐린저항, 근육연축, 근염자, 구역, 비충혈, 비강출혈, 목의 통증, 종ий염, 사지통, 이상감각, 인후두통증, 발열, 부비동충혈, 부비염, 종출, 다리경련, 빈뇨, 두근거림, 발진, 인대염자, 실신, 빈맥, 이뇨, 요로감염, 바이러스 감염, 부종, 말초부종, 무력증, 어지럼 등(위약에서 이 약과의 인과관계는 밝혀지지 않았다).
- 국소의 시판 후 조사결과와 다른 임상반응이 매우 드물게 나타났다：혈관부종, 발진, 가려움, 혈청병과 혈관염을 포함한 피부 과민반응/알러르기 반응, 고칼륨혈증, 탈모, 신기능 손상, 근육통, 과립구 침윤과 폐포막의 IgG 축적이 동반되는 히드로클로로티아지드 유도성 폐부종이 여러 건 보고된 바 있다. 바-신지질 폐부종은 히드로클로로티아지드에 대해 드물게 나타나는 면역학적 특이 반응으로 신기능 손상을 유발할 수 있다.
- 국외(일본)에서 실시한 임상시험에서 발사르탄-히드로클로로티아지드 복합제가 투여한 환자에서 이상반응이 보고된 것은 656례 중 268례(43.9%)이며 중대한 이상반응은 다음과 같다.
 - 아나필락시스모양 증상(빈도불명)：아나필락시스모양 증상을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 혈전부종(빈도불명)：얼굴, 입술, 인두, 혀의 부어오름 등의 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 간염(빈도불명)：간염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 신부전(빈도불명)：신부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 고칼륨혈증(빈도불명)：중증 고칼륨혈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 저나트륨혈증(빈도불명)：관대감, 식욕부진, 구역, 구토, 의식장애 등을 동반하는 저나트륨혈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다(고령자에게 나타나기 쉽다).
 - 쇼크, 실신, 의식상실(모두 빈도불명)：쇼크, 혈압저하에 따르는 실신, 의식상실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히 일정한 감염요법치료 중, 혈압강하 이뇨제의 투여 등의 환자에서 나타나는 상태를 충분히 관찰해야 한다.
 - 무파열구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소(모두 빈도불명)：무파열구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 재생불형성빈혈, 용혈성빈혈(모두 빈도불명)：중증의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 과사성혈관염(빈도불명)：과사성혈관염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 독성피피과사용해(리얼증후군)(빈도불명)：독성피피과사용해(리얼증후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 간질성폐렴(빈도불명)：발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선이상 등을 동반한 간질성폐렴이 나타날 수 있으므로 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 부신피질호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다.
 - 폐수종(빈도불명)：폐수종이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 전신 홍반성 루푸스의 악화(빈도불명)：전신 홍반성 루푸스를 악화시킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 저혈당(빈도불명)：저혈당이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 탈락감, 공복감, 식욕부, 손의 떨림, 집중력 저하, 경련, 의식장애 등이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다(당뇨병 환자, 특히 노인에게 나타날 수 있는 환자에서 나타나기 쉽다).
 - 황반근융해증(빈도불명)：근육통, 탈락감, 크레아티닌치아제(CK) 상승, 혈중 또는 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 황반근융해증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 국내 시판 후 조사결과
 - 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 725명을 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응의 발현증례율은 인과관계와 상관없이 2.62%(19례/725례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.79%(13례/725례)이다. 두통, AST상승, 어지럼, 두근거림, 소화불량(각 0.28%(2례), 부종, 무력, 고중성지방혈증, 크레아티닌치아제(CK) 증가, 기침이 0.14%(1례)로 나타났다. 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 크레아티닌치아제 증가가 보고되었다.

- 발사르탄 단독투여 임상시험 중 인과관계와 상관없이 보고된 기타 이상반응 중 1% 이상의 빈도로 발생한 것은 관절통, 1% 미만으로 성숙감퇴, 급성신부전, 간질적 기침(각 0.1% 이상), 부종, 상복부통, 불면증, 발진, 어지럼이 있었다.
- 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제를 단독으로 투여시 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.
 - 전해질 및 대사이상：이 약：매우 자주(특히 고용량에서) 저칼륨혈증, 혈중 지질 상승, 자주 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증, 저마그네슘혈증 및 고요산혈증, 드물게 고칼슘혈증, 매우 드물게 저염소혈증성 일탈리증이 나타날 수 있다. 포도당 내성을 변경시킬 수 있고, 혈청 콜레스테롤, 중성지방 및 요산 수치의 증가를 일으킬 수 있다. 드물게 고혈당증, 당뇨병, 당뇨병사의 약화가 나타날 수 있다(신증후역형 참고).
 - 피부：자주 두드러기 및 다른 종류의 피부발진, 드물게 광민감반응, 매우 드물게 과사성 혈관염 및 독성피피과사용해(리얼증후군), 피부 홍반성 루푸스모양 발진, 피부 홍반성 루푸스의 재발
 - 소화기계：자주 식욕감퇴, 경증의 구역, 구토, 드물게 복부불편감, 변비, 설사, 위장관계 불편감, 매우 드물게 위장염
 - 간：드물게 간내 담즙정체 또는 황달
 - 순환기계：자주 기립저혈압(알코올, 마취제 또는 진정제에 의해 악화될 수 있다.), 드물게 심장 부정맥
 - 중추신경계：감각소실 또는 진정, 드물게 두통, 어지럼, 수면장애, 우울증, 이상감각
 - 감각기관：드물게 시각장애(대개 첫 주에 주로 나타날 수 있다).
 - 혈액계：드물게 혈소판감소증(때때로 자발성 동반), 매우 드물게 백혈구감소증, 무파열구증, 골수기능부전, 용혈성 빈혈
 - 기타：자주 발기부전, 매우 드물게 과민성 반응, 폐렴, 폐부종을 포함한 호흡곤란
 - 국외 시판 후 경험으로 부위의 약물 사용 빈도(빈도불명)：급성 신부전, 신장애, 재생불형성빈혈, 다형 홍반, 발열, 근육연축, 무력, 급성 폐쇄각 녹내장
- 일반적 주의

- 운전자 기계조작 수행에 대한 이 약의 효과에 대한 연구는 없으나 운전 또는 기계조작을 할 때 어지럼 또는 졸음이 나타날 수 있다는 것을 고려해야 한다.
- 중성성 저혈압：이 약을 투여 받은 환자에서 특히, 치료 첫 수일 동안 어지럼이 발생할 수도 있다는 주의사항을 설명하고, 어지럼 발생 시 의사에게 알리도록 하여야 한다. 또한 환자들에게 부적절한 수액 투여, 과도한 발한, 설사, 또는 구토가 과도한 혈압 강하를 일으킬 수 있다(신기능이 약한 환자에서는 주의사항도 살펴보아야 한다).
- 칼륨보충：이 약을 투여 받은 환자에게 의사와 상의 없이 칼륨보충제 또는 칼륨함유 염류제를 사용하지 않도록 교육하여야 한다.
- 신동맥협착증 환자：혈청 크레아티닌 및 혈액요소가 증가할 수 있으므로 약측 또는 단백 신동맥협착증 환자, 협착증이 일어난 단신증 환자에 이 약을 사용해서는 안 된다.
- 티아지드계 이뇨제는 새롭게 저칼륨혈증을 발생시키거나 기존의 저칼륨혈증을 악화시킬 수 있다. 칼륨 저하가 심해진 환자(예, 염-소실 신장병증 및 신전성 (prerenal, 심인성) 신기능장애 환자)에게 티아지드계 이뇨제 투여 시 주의하여야 한다. 저칼륨혈증이 임상증상(예, 근육약화, 불완전마비, 또는 심전도변화)을 동반하는 경우, 이 약의 투여는 중지되어야 한다. 티아지드계 이뇨제는 저칼륨혈증 및 동반된 저마그네슘혈증이 있을 경우 고칼치료 후에 투여하는 것이 권장된다. 칼륨 및 마그네슘의 혈중 농도는 정기적으로 확인해야 한다. 티아지드계 이뇨제를 투여 받은 모든 환자는 전해질, 특히 칼륨의 불균형을 모니터링 하여야 한다. 티아지드계 이뇨제는 저나트륨혈증 및 저염소성 일탈리증을 새롭게 발생시키거나 기존의 저나트륨혈증을 악화시킬 수 있다. 신경계 증상(구역, 진행성 방황감각상실, 무감동)이 동반된 저나트륨혈증이 개발 사례로 관찰된 바 있다. 혈청 나트륨 농도의 정기 모니터링이 권장된다.
- 고령환의 이뇨제 투여로 중증의 나트륨 결핍 및/또는 체액결핍이 나타난 환자의 경우 이 약 투여 초기에 드물게 중증성 저혈압이 나타날 수 있다. 따라서 반드시 나트륨 및 체액결핍상태를 보정한 후 이 약을 투여하고, 그렇지 못한 경우는 의료전문가 감시하에 투여하도록 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 반듯한 자세로 놓고 필요하다면 생리식염 주사액을 적적주입한다. 혈압이 안정된 후 약물투여를 계속한다.

- 경증~중등도 신장애 환자(크레아티닌청소율 ≥ 30mL/min)에게 투여 시 용량조절은 필요하지 않다. 이 약은 하이드로클로로티아지드를 함유하기 때문에 중증의 신장애 환자(크레아티닌청소율 < 30mL/min)에게 이 약은 금기이다. 티아지드계 이뇨제는 만성 신장 질환 환자에게 질소혈증을 유발할 수 있다. 이 약을 신장애 환자에 사용할 경우 혈청 칼륨, 크레아티닌 및 요산 레벨의 정기적인 모니터링이 권장된다.
- 신신식 환자：최근 신기능을 한 환자(예)에 이 약의 사용에 대한 안전성 자료가 없다.
- 경증~중등도 간장애 환자(예)에 이 약 투여 시 용량 조절은 필요하지 않으나 발사르탄으로서 1일 80mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 간기능 장애 또는 진행성 간질환이 있는 환자의 경우, 체액 및 전해질 균형에 약간의 변화만으로 간성 혼수를 일으킬 수 있기 때문에, 티아지드계 이뇨제는 주의하여 사용해야 한다.
- 티아지드계 이뇨제는 전신성 홍반성 루푸스를 일으키거나 악화시킬 수 있다.
- 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제는 포도당 내성을 변경시킬 수 있고 혈청 콜레스테롤 및 트리글리세라이드의 증가를 일으킬 수 있다. 다른 이뇨제와 마찬가지로 히드로클로로티아지드는 요산의 청소율을 감소시켜 혈청 요산의 수치를 증가시킬 수 있으며 고요산혈증을 유발 또는 악화시키며 감소성이 있는 환자에게 통풍을 발생시킬 수 있다. 당뇨병 환자에서 인슐린 또는 경구 혈당강하제의 용량 조절이 필요할 수 있다. 티아지드계 이뇨제는 칼슘 대사에 이상이 없는 경우에도 요 중 칼슘 배설을 감소시켜 혈중칼슘농도를 약간 상승시킬 수 있다. 히드로클로로티아지드는 혈청 칼슘 농도를 증가시킬 수 있기 때문에 고칼슘혈증 환자에게 투여 시 주의해야 한다. 티아지드계 이뇨제의 투여 초기에 불응하거나 또는 12mg/dL 이상의 현저한 고칼슘혈증을 보이는 경우는 티아지드계 이뇨제와 무관한 다른 원인에 의한 고칼슘혈증일 수 있다. 지속적으로 티아지드계 이뇨제 치료를 받은 몇몇 환자(예)에서 고칼슘혈증 및 자만신혈증과 함께 부갑상선의 병리적 변화가 관찰된 바 있다. 고칼슘혈증이 발생하면 부갑상선 기능검사가 필요하다. 티아지드계 이뇨제는 부갑상선 기능검사를 시행하기 전 투여를 중단해야 한다. 티아지드계 이뇨제는 갑상선 장애의 징후 없이 혈청 단백질 결합 요오드 수치를 감소시킬 수 있다.
- 광민감반응：티아지드계 이뇨제에서 광민감반응의 사례가 보고되었다. 치료도중 광민감반응이 나타날 경우 치료를 중단하는 것이 권장된다. 티아지드계 이뇨제의 재투여가 필요할 경우 햇빛 또는 인공 UVA 자광이 권장된다.
- 히드로클로로티아지드, 설콘아미드는 급성 일과성 근시 및 급성 폐쇄각 녹내장을 유발한다. 시력 저하 또는 눈의 통증이 급성으로 시작되고 전형적으로 투여 개시 후 수 시간에서 수 주 이내에 발생한다. 설콘아미드 또는 페니실린 알레르기의 병력이 있는 환자에서 급성 폐쇄각 녹내장을 발생시키는 위험 요인이 될 수 있다. 급성 폐쇄각 녹내장을 치료하지 않으면 영구적 시력 손실이 될 수 있다.
- 일차 치료는 가능한 빨리 히드로클로로티아지드의 투여를 중지하는 것이다. 만약 안압이 조절되지 않는다면 즉각적인 약물 또는 외과적 처치를 고려할 필요가 있다.

6. 상호작용

- 발사르탄에 의해 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있다.
 - 발사르탄의 단독 투여 시 다음 약물과의 임상적으로 유의한 상호작용은 관찰되지 않았다.：시메티딘, 와르파린, 푸로세미드, 디곡신, 아테놀롤, 인도메타신, 히드로클로로티아지드, 알로디딘, 글리베클라미드
 - 칼륨：칼륨보충 이뇨제, 칼륨보충제 및 칼륨함유 염류제나 혈청 칼륨수치를 변화시킬 수 있는 다른 약물(예, 해파리과)의 병용은 권장하지 않는다. 발사르탄이 소염진통제(NSAID)：안지오텐신제수용체 길항제(NSAIDs(예, 항염증요법으로 아스피린 COX-2억해제)와 동시에 투여되었을 항고혈압 효과에 감소할 수 있다. 특히 노인환자, 체액이 부족한 환자(이뇨제 투여환자 포함), 또는 신장기능이 저하되어 있는 환자의 경우 신장기능의 악화의 위험성을 증가시킬 수 있다. 그러므로 NSAIDs를 투여하고 있는 환자(예)에 발사르탄 투여를 시작하거나 투여 방법을 변경할 때에는 신장기능의 모니터링이 권장된다.
 - 발사르탄은 우의한 수준까지 대사되지 않기 때문에, 임상적으로 CYP450호제의 대사이유도 또는 대사제해에 의한 약물간 상호작용은 나타나지 않을 것으로 예상된다. 발사르탄은 혈장 단백질과 강하게 결합함에도 불구하고, 생체외 실험에서 디클로페낙, 푸로세미드 및 와르파린과 같이, 단백질과 강하게 결합하는 일련의 분자와 이 수준에서 어떠한 상호작용도 나타나지 않았다.
- 이 약의 투여법 중 하나인 티아지드계 이뇨제로 인한여 다음과 같은 상호작용이 나타날 수 있다.
 - NSAIDs 및 COX-2 선택적 차단제：NSAIDs(예：살리실산 유도체, 인도메타신)과의 병용투여는 티아지드계 이뇨제의 이뇨작용과 항고혈압 효과를 악화시킬 수 있다. 합병증으로 저혈량증이 있을 경우 급성 신부전증이 나타날 수 있다.
 - 혈청 칼륨 수치에 영향을 미치는 약물：이뇨제의 저칼륨혈증 작용은 칼륨 배설성 이뇨제(예, 푸로세미드), 코르티코스테로이드, ACTH, 암포테리신, 카르배네솔론, 페니실린G 및 살리실산 유도체 또는 항부정맥제와의 병용 투여에 의해 증가될 수 있다.
 - 이뇨제관련수치：히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 흡수는 콜레스테롤타민 및 콜레스티폴로 인해 감소된다.
 - 골격근 이완제：티아지드계 이뇨제는 류마제 유도체와 같은 골격근 이완제의 작용을 강화시킬 수 있다.
 - 당뇨병환제：티아지드계 이뇨제는 포도당의 내성을 변화시킬 수 있으므로 인슐린이나 경구용 당뇨병약의 용량 조정이 필요할 수 있다. 히드로클로로티아지드로 인한 기능성 신부전 유발 시 메트포르민의 병용투여로 젯산산증(lactic acidosis)위험이 나타날 수 있기 때문에 주의하여 병용 투여하여야 한다.
 - 아만타딘：티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 병용 투여는 아만타딘에 의한 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있다.
 - 항콜린성 약물：티아지드계 이뇨제의 생체이용률은 항콜린성 약물(예：아트로핀, 비페리덴)과의 병용으로 증가될 수 있으며 이것은 위장관계 운동이 감소되고 위장출시간이 느려지기 때문이다. 반대로 시사포리드와 같은 위장운동 촉진제는 티아지드계 이뇨제의 생체이용률을 감소시킬 수 있다.
 - 메틸도파：메틸도파와 히드로클로로티아지드의 병용시 용혈성 빈혈이 보고된 바 있다.
 - 비타민 D：티아지드계 이뇨제를 비타민 D 또는 칼슘염과 병용시 혈청 칼슘 수치를 증가시킬 수 있다.
 - 시클로스포린：시클로스포린과의 병용은 고요산혈증과 통풍증(gout-type) 합병증의 위험을 증가시킬 수 있다.
 - 알코올, 바르비트레이트 또는 마약：알코올, 바르비트레이트 또는 마약과의 병용 투여는 기립저혈압의 발생을 증가시킬 수 있다.
 - 혈압상승 이민류：히드로클로로티아지드는 노르아드레날린과 같은 승압 이민류의 반응을 감소시킬 수 있다. 그러나 임상적 유의성은 명확하지 않고, 혈압상승 이민류의 사용을 제한할 정도로 나타나지 않았다.
 - 디기탈리스 배당체：티아지드계 이뇨제로 인한 저칼륨혈증 또는 저마그네슘혈증은 디기탈리스로 인한 심장부정맥을 더 쉽게 유발시킬 수 있다.
 - 혈청 나트륨 수치에 영향을 미치는 약물：히드로클로로티아지드와 카르바마제핀을 병용투여하는 환자(예)에서는 티아지드계 이뇨제에 의해, 임상 17회에 고요산혈증을 사용한 것으로 나타났다. 따라서 이러한 환자들에게 저나트륨혈증 발현의 가능성에 대하여 알려주어야 하며 적절한 모니터링 하여야 한다.
 - 리튬：리튬제제와 ACE억제제, 티아지드계 이뇨제의 병용투여로 혈청 리튬 농도의 가역적 증가와 리튬 농도의 증가가 보고되었다. 발사르탄과 리튬의 병용투여한 임상경험은 없다. 리튬과 이 약과의 병용투여는 권장되지 않는다. 병용의 필요성이 증명된 경우 혈청 리튬 수치의 모니터링이 권장된다.
 - 다른 항고혈압 약물：티아지드계 이뇨제는 다른 항고혈압약물(예, 구아네티딘, 메틸도파, 베타차단제, 혈관이완제, 칼슘통로차단제, ACE억제제, 안지오텐신 II 수용체 길항제 및 직접적 레닌 차단제(DRI))의 항고혈압 작용을 증강시킨다.
 - 알로푸리놀：티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 병용 투여는 알로푸리놀에 대한 과민반응 발생률을 증가시킬 수 있다.
 - 항응고제(예, 시클로스포스파미드, 메토트렉세이트)：티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 병용 투여는 세포독성약물들의 신장배설을 감소시킬 수 있으므로 골수억제 효과를 강화시킬 수 있다.
 - 칼슘염류：티아지드계 이뇨제의 병용투여는 세노라에서 칼슘 재흡수를 증가시켜 고칼슘혈증을 유발할 수 있다.
 - 디아제시드 및 베타차단제：티아지드계 이뇨제는 디아족시드의 고혈압 효과를 증가시킬 수 있다. 베타차단제와 티아지드계 이뇨제와의 병용은 고혈당 위험을 증가시킬 수 있다.
 - 요오드 조양제：이뇨제에 기인한 탈수의 경우, 특히 고용량의 요오드 제제를 병용하였을 때 급성 신부전의 위험이 증가된다. 투여 전 재수화(hydration) 해야 한다.

7. 입부 및 수유부에 대한 투여

- 안지오텐신제수용체 길항제의 작용기전 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없다. 임신 2~37 사이에 ACE억제제(레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS))에 작용하는 특정 약물군에 노출된 입부에서 태아바태편을 병용투여하는 환자(예)에서는 보고가 있다. 또한 후향적 자료에 의하면, 임신 17회에 ACE억제제를 사용한 것은 출생결함의 잠재적 위험과 연관 있었다. 태아의 신장관류는 임신 27기에 형성되나, 레닌 안지오텐신 시스템의 영향을 받기 때문에 임신 2, 37에 발사르탄을 복용하면 위험이 증가한다. 임신 2~37기 동안 레닌-안지오텐신계에 직접 작용하는 약물의 사용은 저혈압, 신생아 두개골 저형성증, 무뇨증, 가역적 또는 비가역적 신부전, 및 사망을 포함한 태아 및 신생아의 손상과 관련이 있는 것으로 나타났다. 양수과소증이 보고된 바 있으며, 양수과소증은 태아 사지구소증, 두개안면 기형, 및 폐 발달부전 등과 관련이 있는 것으로 나타났다. 약물배출과의 관련성이 명확하지 않으나, 미국아 출산, 자궁내 발육 부진 및 동맥관 개존증이 또한 보고되었다. 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 자궁 노출 시 태아 또는 신생아의 황달, 혈소판감소증이 유발될 수 있고 성인에서 나타나는 다른 이상반응도 일어날 수 있다. 입부가 우방적으로 발사르탄을 복용했을 때 자연 유산, 양수과소증, 신생아 신기능 이상이 나타났다는 보고가 있었다. 자궁 내에서 약물에 노출되었던 모든 신생아에 대해서는 배뇨작용, 고칼슘혈증, 그리고 혈압을 검사한다. 필요한 경우에는, 순환기에 녹아있는 약물을 없애기 위한 의학적 조치를 취한다. 다른 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물처럼 이 약도 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에서 사용해서는 안되며, 투약 중 임신이 확인되면 즉시 투약을 중지한다. 드물게(1,000명의 입부 당 1명 미만에서) 레닌-안지오텐신계에 작용하는 대제 약물을 찾기 못할 수 있다. 이러한 경우에도 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신 가능성이 있는 여성에게 처방하는 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려 주어야 하며 양수 내 환경을 평가하기 위해 적극적인 초음파 검사를 시행하여야 한다. 양수과소증이 관찰되면 입부의 생명을 구하기 위한 것을 제외하고는 이 약을 중단하여야 한다. 임신 주수에 따라 수축 검사(Contraction stress testing：CST), 무자극감사(nonstress test：NST), 또는 생물리학적 프로파일(biophysical profiling：BPP) 검사가 적절할 수 있다. 그러나 환자와 의사는 태아가 이미 비가역적인 손상이 발생한 이후에도 양수과소증이 나타나지 않을 수 있다는 것을 인식하고 있어야 한다. 자궁에서 안지오텐신제수용체 길항제에 노출된 적이 있는 유아는 저혈압, 빈뇨, 및 고칼륨혈증이 있는지 면밀히 관찰되어야 한다. 핏노가 있다면, 혈압 및 신장관류 수치에 주의를 기울여야 한다. 저혈압을 회복시키고 신기능을 대신하기 위해 고환수혈이나 투석이 필요할 수도 있다.
- 발사르탄이 사람에서 모유 중에 분비되는지의 여부는 밝혀지지 않았으나 랫드에 대한 시험에서 모유 중에 발사르탄의 분비가 확인되었다. 히드로클로로티아지드는 태반을 통과하고 사람에서도 모유로 분비된다. 따라서 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약의 비고 임상시험에서 고령군과 비교령군 사이에 발사르탄-히드로클로로티아지드의 유효성 및 안전성에 대한 전반적인 차이는 관찰되지 않았다.

10. 임상시험에서의 영향

- 이 약을 투여받은 환자의 3.7%, 위약환자의 3.1%에서 20% 이상의 혈청 칼륨 감소가 나타났다(신증후역형 참조).
- 다음 결과가 발사르탄 단일요법에서 나타났다. 이 약 투여시에는 나타나지 않았다.：드물게 해모글로빈 및 헤마토크리트치 감소가 나타났다.
- 대조임상시험 결과 해모글로빈 및 헤모글로빈의 유의치(0.20%)인 감소가 각각 0.8%, 0.4% 나타났다. 반면 위약의 경우 모두 0.1 %가 감소했다.
- 대조임상시험 결과 혈청 크레아틴, 칼륨 및 총 빌리루빈의 농도의 유의적인 증가가 발사르탄 투여 환자의 경우 0.8%, 4.4%, 6.0%였고 ACE억제제의 경우 1.6%, 6.4%, 12.9%였다. 또한 대조임상시험에서 이 약 투여군에서는 크레아티닌과 BUN 상승이 각각 1.9%, 14.7% 나타났다. 위약 투여군에서는 각각 0.4%와 6.3% 나타났다.
- 때때로 발사르탄의 투여로 간기능 검사치의 상승이 보고되었다.
- 이 약을 투여하는 본태고혈압 환자에 대해 특별한 임상검사가 필요한 정도는 아니다.
- 호중구감소는 이 약을 투여받은 환자의 0.1%에서, 위약을 투여받은 환자의 0.4%에서 관찰되었다.

11. 과량투여시의 처리

- 사람에 대한 과량 투여 관련 데이터는 제한적이다. 과량투여로 나타나기 쉬운 증상은 저혈압과 빈맥이다.：발사르탄의 과량투여는 현저한 저혈압을 일으킬 수 있고, 이는 의식저하, 순환성 저탈 및 쇼크로 나타날 수 있다. 복용 직후이면 구토를 유도하고, 그 외에는 생리식염 주사액을 정맥 내로 투여한다. 히드로클로로티아지드와의 과량투여도 다음과 같은 증상이 나타날 수 있다.：구역, 출혈, 저혈당증, 부정맥과 관련된 전해질 이상, 근육 경직, 과량투여 이후 시간, 중증이나 중증상의 정도에 따라 조처해야 하는 순환안정제의 회복이 가장 중요하다. 만일 복용 직후라면 구토를 유도하고, 이 약을 투여받은 환자에서 중증 이상의 활성탄을 투여한다.
- 저혈압의 경우 환자를 반듯이 놓고 가능한 한 빨리 혈장대체를 한다. 발사르탄은 혈장단백과의 강한 결합 때문에 혈액투석으로는 제거되지 않으나 히드로클로로티아지드는 투석으로 제거될 수 있다.
- 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- 기타
 - 여러 종의 물질을 이용한 발사르탄, 히드로클로로티아지드, 발사르탄/히드로클로로티아지드의 전임상 안전성시험에서, 전신 또는 특정 장기에 대한 독성의 증가는 없었다. 발사르탄/히드로클로로티아지드(100/31.25~600/187.5mg/kg)의 고용량은 랫드에서 적혈구 세포 수치(적혈구, 해모글로빈, 헤마토크리트)를 감소시켰으며, 신장의 혈액학을 변형시켰다(중등도 내지 중증의 혈중 요소 증가, 혈청 칼륨 및 마그네슘의 증가, 경증의 요양 및 전해질 증가, 약간의 세노관 호염기구증가증, 최고 용량에서 수반 소용액면대(alterent anterior hydropathy) 발달. 마모셋에서(30.9375~400.125mg/kg), 변화는 상당히 유사하였으나 더 중증의 양상을 나타났다. 특히 고용량의 경우 신장애에 신장병이 나타났으며, 이는 요소와 크레아티닌 증가를 포함하였다.
 - 신 방사구계세포(renal glomerular cell)의 비대 또한 두 종에서 관찰되었다. 모든 변화는 발사르탄/히드로클로로티아지드의 상승적(부가적)이 보단 발사르탄 단독에 비해 약 10배(상승) 약리 작용에 의한 것으로 간주되며, 특히 마모셋에서 오랫동안 저혈압을 나타냈다. 발사르탄-히드로클로로티아지드의 치료용량은 사람에서 신장사구체세포 비대에 관련하지 않을 것으로 보인다. 주요 전임상 안전성 결과는 상승성으로 작용하는 것으로 보이는 약물의 약리작용에 의한 것이며, 두 약물의 다른 상호작용의 증거는 없다. 임상시험 결과, 두 약물의 작용은 부가적이었으며, 전임상 결과와는 임상적 의미를 나타내지 않았다.
 - 발사르탄/히드로클로로티아지드는 상호작용의 증거가 없었으며, 이에 병용성으로 돌연변이 유발, 염색체 이상, 또는 발암성을 시험하지는 않았다. 그러나 발사르탄과 히드로클로로티아지드는 각각 돌연변이 유발, 염색체 시험을 하였으며, 모두 음성결과를 나타냈다.

【포장단위】 100정

【저장방법】 기밀용기, 30℃이하 보관

【제 조 자】 삼진제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

【제조·외지자】 (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

- * 본 의약품은 우수의약품관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용시 변질, 변태 또는 오손된 제품을 발견할 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 약을 사용하시거나 치료 받드시 본 설명서를 읽어야주시기 바랍니다. 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참고하시기 바랍니다.
- * 내가 신고한 적은 부작용 국민감각 조석된다. (온라인의약품도서관：+577-1255, drug.mids.go.kr)
- * 이 첨부문서의 개정년월일 이후로 변경된 허가사항은 당사 홈페이지(http://www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.
- * 제품에 관한 자세한 사항은 판매원 고객센터삼십 080-023-5757로 문의 주시기 바랍니다.

http：// www. bi-nex.com

☎ 080-023-5757

개정년월일：2015년 01월 30일