

연골구성성분+활성비타민

루마콘300®

연질캡슐

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

현대약품 루마콘300연질캡슐은 황산콘드로이틴나트륨을 비롯하여 복합비타민을 함유하는 제제로써, 신경통, 근육통, 관절통과 같은 통풍성 질환과 말초혈행장애로 나타나는 이끼·목결림, 수족저혈과 같은 증년 이후에 자주 발생하는 각종 신경 및 근육적 질환을 효과적으로 완화시켜 줍니다. 또한 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하 및 노년기의 비타민 공급에 도움을 주는 복합비타민제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,580mg) 중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	300.00mg
티아민질산염(KP)	25.00mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서 50IU)(KP)	50.00mg
판토텐산칼슘(KP)	30.00mg
니코틴아미드(KP)	30.00mg
피리독신염산염(KP)	25.00mg
시아노코발라민0.1%(시아노코발라민으로서 30μg)(KPC)	30.00mg
말닐엑스(100→1)(KPC)	2.00mg
첨가제(타르색소)	적색40호, 황색203호, 청색1호

【성 상】 미황색의 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급
 - 육체 피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 체력저하
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화
 - 이끼·목결림, 수족저혈·수족냉증
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

【용법·용량】 8세 이상 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 씹 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 1세 미만의 영아
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부, 수유부

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 붉은 변
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 많이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 예스트로겐을 포함한 경우를 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 6) 고당혈 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파 약물과 병용투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60, 120캡슐

- 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 오용을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 이 제품에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품 문의처로 문의하십시오.
- 이 사용설명서 개정년월(2009년 2월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎080-024-5525)에서 확인하실 수 있습니다.

☎ 제품문의처 : ☎080-024-5525
사용설명서 개정년월 : 2009. 02

판매처
현대약품(주)
충청남도 천안시 동남구 남문로 200

제조사

알앤피코리아(주)
경기도 의정부시 향남읍 산성로 900-4
의정부공장 7층 701호