

효과빠른 종합소화효소제

다이제스토^정



8 806845 003501

일반의약품 / 분류번호 02330

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

원료약품 및 그 분량 : 1 정 중

유효 성분 : 판크레아틴(USP).....	175.0mg	우담즙엑스(생규)(콜린산으로써 11.25mg).....	25.0mg
디메치콘(NF).....	25.0mg	헤미셀룰라제(KP)(125헤미셀룰라제단위).....	50.0mg

첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호.....적량

동물유래성분 : 판크레아틴(돼지, 돼장) 유당수화물(소, 우유) 우담즙엑스(소, 담즙)

기타첨가제 : 글리세린모노스테아레이트, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유, 히프로멜로오스2910, 히프로멜로오스프탈레이트

성 상 : 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정

효능 · 효과 : 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

용법 · 용량 : 만 15세 이상 및 성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30 °C)

사용기간 : 제조일로부터 36개월

포장단위 : 10정

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 화일약품(주)(02-564-2722)으로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주시기 바랍니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마시기 바랍니다.

작성연월일 : 2011년 09월 01일

개정연월일 : 2017년 09월 22일

제조의뢰자 : 화일약품(주) 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 156

제 조 자 : 정우신약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 60

판 매 원 : 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동)

DGO1709.08

SM-17-09