



다양한 치주질환에

효과적인 4가지 복합성분

일반의약품

티스란에프

캡슐

TEETHRAN F Caps.

분류번호: 231
(치과구강용약)

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

주성분: 리소짐염산염(KP) 30.0mg(역가)

주성분: 카르바조크롬(KP) 2.0mg

주성분: 토크페롤아세테이트2배산(KP) 10.0mg
(토크페롤아세테이트로서 5.0 IU)

주성분: 제피아스코르브산(별규) 156.3mg
(아스코르브산으로서 150.0mg)

동물유래성분(기원동물 및 사용부위): 리소짐염산염(닭의난백)

동물유래성분(기원동물 및 사용부위): 유당수화물(소의우유)

착색제(타르색소): 황색203호

【성 상】 엷은 주황색 가루가 든 상하부 노란색의 경질캡슐

【효능·효과】 치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

4) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

2) 피부: 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수증등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.

3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐, 150캡슐, 300캡슐

DS-1412-02

첨부문서 최초 작성년월일 2009.04.06

첨부문서 최종 개정년월일 2014.12.05

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조 및 판매원
동성제약주식회사

본사: 서울시 도봉구 도봉로 683(방학동)

공장: 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

www.dongsung-pharm.co.kr

소비자상담전화: 080-001-0921