



뇌 및 말초혈액순환촉진제 강코탄¹²⁰ 정 은행업건조엑스

【원료약품 및 분량】1정중

- 유효성분 : 은행업건조엑스(생규)(총강코플라본배당체로서 28.8mg) 120mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색1호알루미늄레이크, 황색4호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르나우바납, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【효능·효과】

1. 주효능·효과

- 1) 말초동맥순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【성상】녹색의 원형 필름코팅정

【용법·용량】

성인

1. 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행업건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다.복용한다)
2. 기질성 뇌기능장애 : 은행업건조엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회, 1회 120mg을 1일 2회 경구투여한다.(먹는다.복용한다)
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증이 있는 환자.
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 않는다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호타르트라진을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 어지러움 · 가려움증

4. 일반적 주의

이 약은 고혈압치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압환자에는 투여하지 않는다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

6. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】제조일로부터 36개월

【포장단위】100정, 200정

【제조외의사】한국프라임제약(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

【판매원】(주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

【제조자】영풍제약(주) / 인천광역시 남동구 함박외로 333

【소비자상담실】080-700-8487

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색에서 확인하실 수 있습니다.

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서를 꼭 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)