

우르스정

설명 -841-01 - 1

일반의약품

분류번호 238

KGMP제품

[원료약품 및 그 분량 1정 중]

수산화마그네슘 (USP).....	500.0mg
우르소데옥시콜린 산 (KP).....	10.0mg
노회엑스 (EP).....	100.0mg
(히드록시안트라센유도체 (바바로인) 으로서 20.0mg)	

[성상] 백색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과] 변비 또는 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

1회 1정 성인(15세 이상) 1일 3회, 11~14세 1일 2회 식전(식간 또는 식후)에 복용하십시오.
복용간격은 4시간 이상으로 하십시오. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.
 - 심한 복통 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 신장에 환자
 - 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 이상반응
이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법, 용량을 잘 지켜십시오.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 - 1주정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 소아에 대한 투여
 - 이 약은 7세 미만의 영, 유아에게 투여하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관하십시오.
 - 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 자시포장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온 (1~30℃)보관

- ※ 상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 이상반응이 나타날 수 있습니다.
※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

작성년월일 : 2009년 04월 21일



청계제약(주)

경기도 화성시 양감면 대안리 1106-4

소비자 상담실 : 02-554-2639

홈페이지 : www.chunggei.co.kr