

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

지사제

일반의약품

디탈그린 캡슐

Ditalgreen^{cap.}

■성분 · 함량

1 캡슐 중

아크리놀수화물(KP)	10mg
비스무트차질산염(KP)	100mg
베르베린염화물수화물(KP)	25mg
스코폴리아엑스(KP)	7.5mg

(총알칼로이드로서 75.0 μ g)

첨가제(타르색소) : 황색 5호, 적색 3호

■성 상

상부 오렌지색, 하부 미황색의 경질캡슐

■효능 · 효과

설사, 복통을 수반하는 설사, 식체, 묽은 변, 토사

■용법 · 용량

성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후에 복용합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부, 신생아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- 3) 위 십이지장궤양 등이 있는 환자 (비스무트 염류를 함유하는 제제)
- 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.

- 2) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통, 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로無理하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의합니다.
 - 3) 투여시에는 음주하지 않습니다. (비스무트 염류를 함유하는 제제)
 - 4) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
 - 5) 3일 이상 계속하여 투여하지 않습니다.
5. 상호작용
위장진통 · 진경제와 병용투여하지 않습니다.
6. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 이하의 영 · 유아에게 투여하지 않습니다.
7. 저장상의 주의사항
- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

■포장단위 : 10 캡슐

■저장방법 : 밀폐용기

■사용기한 : 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■소비자상담 : 080-203-6000 (수신자 부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부분서 작성일(2009년 4월 14일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.

최초 작성연월일 : 20090414

최종 개정연월일 : 20090414

제조의뢰자 :

제조사 :

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평동 48-5
<http://www.kolonpharm.co.kr>



청계제약(주)

경기도 화성시 양감면 대왕리 1166-4
소비자 상담실 : 02-554-2839
홈페이지 : www.chunggeol.co.kr