

비시드에프정

일반 의약품

분류번호 : 234

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 건조수산화알루미늄 겔(KP) 250mg
탄산마그네슘(KP) 160mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소/우유)
- 기타 첨가제 : 라우릴황산나트륨, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량] 성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 만 7세 이하의 어린이
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장장애 환자
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 용기라벨 표시일까지

[포장단위] 500정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(2020.05.28) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://new.jeyak.co.kr>이나 소비자 상담실로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)



오스틴제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20
소비자상담실: 080-010-5510