

아로나민이엑스

정은 고용량의 비타민 B군을 함유하여 육체피로, 눈의 피로 회복은 물론 신경통, 근육통, 어깨·목 결림에도 효과적으로 작용합니다. 심혈관 질환과 연관성이 알려져 있는 호모시스테인의 대사에 도움이 되는 비타민 B6, B12, 폴산(엽산)을 함유하여 건강을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 뿐만 아니라 혈액순환 개선을 통하여 손발 저림, 수족 냉증(손발이 차가움)증상의 개선에도 효과적입니다.

다음과 같은 경우에 좋습니다.

1. 신경통, 근육통, 관절통, 육체피로에-


신경비타민(B1, B6, B12)은 신경의 재생과 신경전달물질 생성에 도움을 주고 신진대사를 원활하게 해주는 작용을 합니다. 아로나민이엑스 정은 비타민 B군(B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), 특히 활성형 비타민 B1인 푸르셀티아민을 함유하여 신경의 통증을 유발하는 피로물질을 배출시키고, 에너지 대사를 원활하게 하여 신경, 근육, 관절의 통증을 완화하고 육체피로를 회복시킵니다.

2. 말초혈행장애, 어깨·목 결림, 수족저림에-

아로나민이엑스정에 함유되어 있는 비타민E와 γ -오리자놀의 항산화작용으로 세포막을 건강하게 유지하고, 적혈구의 파괴를 막아 말초혈행개선으로 어깨·목결림 등과, 말초혈관확장작용을 통해 손발저림, 수족냉증(손발이 차가움) 등의 증상 개선에도 효과적입니다.

3. 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염에-

피부, 점막의 염증은 비타민B와 니코틴산아미드등의 부족으로 많이 나타납니다. 아로나민이엑스정의 고함량 활성 비타민B군과 니코틴산아미드가 피부세포의 재생과 회복을 도와 구강 및 피부질환 치료에 도움을 줍니다.



● 원료약품의 분량 (Composition)

1정중(Each tablet contains)	
푸르셀티아민염산염(Fursultiamine HCl)	54.57mg
(활성비타민B1, KP) (푸르셀티아민으로서 50mg)	
피리독신염산염(Pyridoxine HCl) (비타민B6, KP)	50.0mg
시아노코발라민100배산(Cyanocobalamin)	50.0mg
(비타민B12, 별규) (시아노코발라민으로서 500 μ g)	
토코페롤아세테이트2배산(Tocopherolacetate)	100.0mg
(비타민E, KP)(토코페롤아세테이트로서 50mg)	
폴산(엽산, Folic acid) (비타민B9, USP)	0.25mg
판토텐산칼슘 (Calcium pantothenate)(비타민B5, KP)	15.0mg
니코틴산아미드(Nicotinamide,비타민B3,KP)	20.0mg
리보플라빈(Riboflavine) (비타민B2, KP)	5.0mg
γ -오리자놀 (γ -oryzanol, KP)	5.0mg
첨가제(타르색소) : 황색5호	

● **성상** : 이 약은 연한 노란분홍색의 타원형 필름코팅정입니다.

Aro-EX

● 용법·용량

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2정을 1일 1회 복용 또는 1회 1정씩 2회 복용합니다.

● 효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, E의 보급 :

육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기

－ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- － **비타민B₁** : 다음 증상의 완화 – 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의피로
- － **비타민B₆** : 다음 증상의 완화 – 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- － **비타민E** : 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 – 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

● 사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 만 1세 미만의 젖먹이
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 우발적으로 과량복용 한 경우 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(케이스, 알루미늄호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

※ 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물(알루미늄호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 정제(알약)만 복용하시기 바랍니다.

● 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 100정

※5030435-1150129

※ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2015년 1월 29일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

ILDONG 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우로27길 2

공장 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 (전화)080-022-1010(수신자부담)

아로나민[®]
이엑스^정

고함량 활성비타민B₁, B₆, B₁₂, E, 폴산