

하루한번! 고향향 실리마린 제제

리시브골드

| 밀크시슬엑스 350mg |

일반의약품	
의약품 분류번호	319 간장질환용제

간경변, 독성 간질환, 만성 간염

» 간기능 강화 / 간기능 개선

간의 적신호 체크

- 쉽게 피로하고 회복이 늦다
- 음주 후 숙취가 오래간다
- 헛배가 부르고 매스껌다
- 기미, 습진, 가려움증등 피부질환이 생긴다

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생규).....350.00mg

(실리마린으로서 196mg)

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

[성상] 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색(검 붉은색)의 정방형 연질캡슐

[효능·효과] 다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량] 1일 1회, 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 심한 담도(담관, 쓸개길) 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 임신, 수유부
 - 고지단백혈중, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[교환 및 제품문의] 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.
연락처 : 고객센터 1588-2675

[제조자] (주)알피코프 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

첨부문서 작성년월일 : 2013. 5. 23 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자

jw 중외제약

제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진1길 56

리시브골드설명서-1308-G