

115x156
종이 70모조
접지 115x64
삼진기획

혈압강하게

전문약품

휴테칸플러스정

HT-200306

HUTECAN PLUS Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 칸데사르탄실렉세틸(USP) 16mg
 히드로클로로티아지드(H)₂ 12.5mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물 (가편동물 : 소, 사용부위 : 우유)

첨가제(타르색소) : 적색40호

기타첨가제 : 경질무수규산, 마크로글15히록시스테아레이트, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로스칼슘, 황색산화철, 히록시프로필셀룰로스

【성상】 옅은 주황색의 타원형 정제

【효능·효과】 개별 성분 치료 효과 차분치 않은 본태성 고혈압

【용법·용량】

식사와 또는 식사와 관계없이 1일 1회 1정 복용
본 제로 전환하기 전에 먼저 칸데사르탄 실렉세틸의 용량을 조절해 보아야 한다. 임상적으로 적절한 때에는 단일요법으로부터 본 제로 직접적인 전환을 고려할 수 있다. 항고혈압효과는 대부분 투여시작 4주 이내에 얻어진다.

1. 노인환자

노인환자에게 본 제 투여 전에 먼저 칸데사르탄 실렉세틸의 용량을 조절한다.

2. 신손상 환자

신손상 환자들에게는 치아자이드계 이노제 보다는 루프이노제를 추천한다. 크레아티닌 클리어런스가 30ml/min/1.73㎡BSA

이상의 환자에서는 본 제로 전환하기 전에 먼저 칸데사르탄 실렉세틸의 용량조절을 고려한다.

심한인 신손상 환자(크레아티닌 클리어런스 30ml/min/1.73㎡BSA 이하)에게는 투여하지 않는다.

3. 간손상환자

경증·중등증의 간손상 환자에게 본 제를 투여하기 전에 먼저 칸데사르탄실렉세틸의 용량을 조절하는 것이 추천된다. 중증의 간손상 환자 또는

담즙울체 환자에게는 투여하지 않는다.

4. 소아

소아에서 안전성 및 유효성은 입증되지 않았다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 약의 어떤 성분이나 설본아미이드 유도체 약물에 과민반응을 나타내는 환자(히드로클로로티아지트는 설본아미이드 유도체임)

2) 임신부 또는 수유부

3) 심각한 신손상 환자(< 30ml/min/1.73㎡BSA)

4) 심각한 간손상 환자 또는 담즙울체 환자

5) 지료불응성 저칼륨혈증, 저칼슘혈증

6) 동통환자

7) 약은 유효성을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는

포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다(유당 함유 제제에 한함).

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 혈액량감소나 나트륨 결핍 환자에서, renin-angiotensin-aldosterone계에 영향을 미치는 다른 약물들에서도 같이 중상성 저혈압이 발생할 수

있으므로 중상이 개선되기까지는 이 약을 투여하지 않는 것이 좋다.

2) 체액 및 전해질 균형의 작은 변화가 간성호수를 유발할 수 있으므로 치아자이드는 간기능이 손상되거나 진행성 간질환이 있는 환자에게

투여시 주의를 요한다. 간부전 환자에게 이 약을 투여한 경험은 없다.

3) 대동맥판 및 심모반 협착증(부후형 폐쇄성 심근병증) : 다른 혈관화장제와 같이 혈액역학적으로 관련있는 대동맥판 또는 심모반 협착증이나

부후형 폐쇄성 심근병증 환자에게 특별한 주의가 요구된다.

4) 비축색소 피부암(MSC)

히드로클로로티아지드 노출 누적용량 증가에 따른 비축색소 피부암(기저세포암, 편평세포암)의 증가 위험이 덴마크 국립 암 레지스트리에

관한 두 건의 역학연구에서 보고되었다. 히드로클로로티아지드의 광안민 작용은 비축색소 피부암 기전으로 작용할 수 있다.

히드로클로로티아지드를 복용하는 환자에게는 비축색소 피부암 위험에 대한 정보를 제공해야 하고, 정기적으로 피부의 새로운 병변 발생

여부를 확인하고 의심스러운 피부 병변이 발견될 경우 보다하도록 권고해야 한다. 또한 환자에게 피부암 위험을 최소화하기 위해 햇빛이나

UV자외선 노출 제한 및 노출되는 피부 부위를 보호하고 같은 가능한 예방 조치를 권고해야 한다. 의심되는 피부 병변은 조직 생검을 포함한

검사를 즉시 실시한다. 이전에 비축색소 피부암 병력이 있는 환자에게는 히드로클로로티아지드의 사용을 재고할 필요가 있다.

3. 이상반응

임상시험에서 부작용은 경미하고 일시적이었으며 위약과 유사하였다. 부작용의 발생률은 연령이나 성별과 무관하였다. 부작용으로 인해

치료를 중단한 환자는 이 약(3.3%)과 위약(2.2%)에 유사하였다.

이름없는 위약대조군에서 인과관계와 상관없이 8주 동안 1% 이상의 발생율을 나타낸 임상적인 부작용은 다음과 같다.

	위약 (%, n=526)	칸데사르탄실렉세틸/ 히드로클로로티아지드 (%, n=1,025)
두통	5.5	3.2
등의 통증	2.4	3.0
허기증	1.2	2.6
호흡기계 감염	1.4	2.5
유혈성감기와 유사한 증상	1.6	2.1
부비동염	1.6	1.7
기관지염	1.4	1.7
노로감염	0.4	1.4
오심	0.6	1.3
티바상	1.2	1.2
빈맥	0.8	1.1
피로	0.8	1.1
복통	0.8	1.0
인두염	1.0	1.0

방싹률률, 구두는 위약군에서는 나타나지 않았으나 이 약 투여군에서 0.5% ~ <1%의 발생율을 나타내었다.

일반적으로, 이 약이 임상적인 임상 검사치에 중요한 영향을 미치지 않는 않는다. 혈당, 혈장 요산, ALAT(SGPT)의 상승이 위약군(각각 0.2%, 0.4%, 0%)에 비해 이 약 투여군(각각1.0%, 1.1%, 0.9%)에서 다소 빈번하게 나타났다. 이 약을 투여한 환자에서 헤모글로빈이 약간 감소되었고

혈청 ASAT(SGPT)의 증가가 관찰되었다. 크레아티닌, 요산 및 칼륨의 증가와 나트륨의 감소가 관찰되었다.

칸데사르탄 실렉세틸 단일요법과 위약 대조군에서 치료와 관계 없이 8주간의 누적 발생율이 1% 이상인 부작용은 기침, 설사, 말초부종 및 비염이었다. 혈관부종, 발진, 두드러기, 소양증은 매우 드물게 보고되었다. 또한 간 효소 증가, 비정상적인 간기능, 간염이 매우 드물게

보고되었고 백혈구감소증, 호중구감소증, 무과립혈증도 매우 드물게 나타났다. 시한 후 경험에서 관절통, 근육통, 민감한 환자에서 신부전을

포함한 신장장애가 매우 드물게(1/10,000) 보고되었으며 설사가 빈도불명으로 보고되었다.

히드로클로로티아지드에서 보고된 부작용은 다음과 같다.

· 식욕부진, 위장저조, 설사, 변비, 황달(간내 담즙울체성 황달), 헤장염, 백혈구감소증, 호중구감소증/무과립구증, 혈소판감소증, 재생불량성

빈혈, 용혈성 빈혈, 골수억제, 광과민 반응, 발열, 발진, 피부 홍반성 낭창 유사 반응, 피부 홍반성 낭창 발진, 과다성 혈관염(혈관염

피부 혈관염), 아나필락시스 반응, 독성 표피괴사증, 호출근(레르만) 증후군 포함) 고혈당증, 당뇨, 고나트륨혈증, 전해질 불균형(저나트륨혈증

저칼륨혈증 등), 콜레스테롤 및 트리글리세라이드 증가, BUN 및 혈청 크레아티닌 증가, 신부전, 간질성 신염, 근경련, 쇠약, 불인, 일시적

시각장애, 기면후 투통, 기립성 저혈압, 피로, 감각이상, 신부전증, 수면이상, 우울, 급성 간지, 급성 폐색성 늑막성

코에서 심각한 조사기전 동안 2,304례를 실시한 안전성 평가 결과 이상반응의 발생률은 인과관계와 상관없이 10례에서 11건(0.43%)

으로 보고되었다. 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율은 8례에서 9건(0.36%)으로 다음과 같다.

가. 중증 및 말초신경계 이상: 허기증 0.13%(3례/2,304례), 두통 0.04%(1례/2,304례)

나. 전신이상: 부종 0.04%(1례/2,304례)

다. 근육격계 이상: 근육통 0.04%(1례/2,304례)

라. 대사 및 영양이상: 과칼슘혈증 0.04%(1례/2,304례)

마. 위장관계 이상: 구역 0.04%(1례/2,304례)

바. 청각 및 전정 이상: 이통 0.04%(1례/2,304례)

이 중 현재 허가사항에 기재되어 있지 않은 예상하지 못한 새로운 약물이상반응으로 근육통, 이통 각 1례(0.04%)이었으며, 중대한 이상반응은

보도되지 않았다.

4. 일반적 주의

1) ACE 저해제와 같이 renin-angiotensin-aldosterone계에 영향을 미치는 다른 약물들은 양측성 신동맥 협착환자나 신장이 하나인 환자에서

신동맥 협착이 발생했을 때 혈당 요소와 크레아티닌 수치를 증가시킬 수 있다. 이 약의 투여와 관련해 보고된 바는 없으나 유사한 효과

2) 신손상/신장이상: 이 환자군에게는 치아자이드계 이노제 보다는 루프 이노제를 투여하는 것이 권장된다. 이 약을 신장기능 손상환자에게

투여하는 경우 칼륨, 크레아티닌, 요산 수치를 주기적으로 모니터링 하도록 권장한다. 최근에 신장 이식한 환자에서 이 약을 투여한 경험은

없다.

3) 본태성 고알도스테론증 환자는 일반적으로 renin-angiotensin-aldosterone 계를 저해하는 작용으로 항고혈압 효과를 나타내는 약물에

반응하지 않으므로 이들 환자에게는 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

4) 이노제를 투여 받는 환자들은 주기적으로 혈중 전해질 수치를 검사해야 한다. 히드로클로로티아지드 같은 치아자이드계 약물은 체액이나

전해질 불균형을 야기할 수 있다(고칼슘혈증, 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증, 저염소혈증, 저염소혈증, 저염소혈증, 저염소혈증).

5) 현저한 고칼륨혈증은 드물지만 많은 부갑상선기능항진증의 징후일 수 있으므로 부갑상선 기능검사를 실시하기 전에 치아자이드계 이노제를

중단해야 한다.

6) 히드로클로로티아지트는 용량의존적으로 노에서 칼륨 배설을 증가시켜 저마그네슘혈증을 일으킬 수 있다. 이런 효과는 칸데사르탄 실렉세틸과

병용했을 때 잘 발생하는데 것 같다. 저칼륨혈증의 위험은 건강변환자, 이노효과가 과다하게 나타나는 환자, 전해질을 부적절하게 섭취한 환자,

코르티코스테로이드나 부신피질자극호르몬(ACTH)을 병용하는 환자에서 증가될 수 있다.

7) 이 약의 투여와 관련해 보고된 바는 없으나 ACE 저해제나 angiotensin II 수용체 길항제의 투여시 특히 심부전이나 신부전이 있는 경우

고칼륨혈증을 일으킬 수 있다.

8) 치아자이드는 마그네슘 배설을 증가시켜 저마그네슘혈증을 일으킬 수 있다.

9) 치아자이드계 이노제의 투여는 내당능을 순화시킬 수 있으므로 인슐린과 같은 항당뇨병약물을 투여하는 경우 용량조절이 필요할 수도 있다.

10) 당뇨병 당뇨병은 치아자이드요법 중 발현될 수도 있다. 그러나 이 약에 함유된 12.5mg의 용량에서는 영향이 거의 없거나 영향이 없는

것으로 보고되어 있다. 치아자이드계 이노제는 혈중 뇨산 수치를 증가시키고 예민한 환자에서는 통풍이 발생할 수도 있다.

11) 혈관 톤(tone)과 신기능이 주로 renin-angiotensin-aldosterone계에 좌우되는 환자들 (예 : 중증의 용혈성 심부전, 신동맥 협착증과 같은

신장 질환 환자)의 경우에는 이 제에 영향을 미치는 다른 약물의 투여와 저혈압, 고질소혈증, 피로, 또는 드물게 급성 신부전 발생과

관련되어 있었다. ACE 수용체 길항제에서 유사한 가능성을 배제할 수 는 없지만 이런 효과는 이 약 투여와 관련해 보고된 바 없다.

다른 항고혈압약제와 마찬가지로 허혈성 심질환이나 죽상경화성 뇌혈관질환 환자에서 과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌졸중을 유발할

수 있다.

12) 히드로클로로티아지드에 대한 과민반응은 알레르기나 가려진 전신의 병력이 있는 환자나 혹은 없는 환자에서도 발생할 수 있으나 이런

병력이 있는 환자에서 더 나타나기 쉽다.

13) 치아자이드계 이노제의 사용과 관련해 전신성 홍반성 낭창의 약하나 혈상화가 보고된 바 있다.

14) Angiotensin II 수용체 길항제로 치료 받는 환자들에서 renin-angiotensin계의 차단으로 인해 마취 및 수술 중 저혈압이 발생할 수 있다. 매우

드물게 정맥용 액제 그리고/또는 혈압상승제를 사용하여 할 정도로 저혈압이 중증일 수 도 있다.

15) 급성 간지 및 2차 폐색성 늑막성, 설본아미이드인 히드로클로로티아지드는 급성 일과성 간지 및 급성 폐색성 늑막증을 일으킬 수 있다.

16) 시력장애 또는 시력의 통풍이 급성 중증으로 나타나며, 일반적용 약물 개시 후 수 시간 내지 수 주 이내에 발생한다. 급성 폐색성 늑막증을

치료하지 않을 경우 영구적으로 시력을 상실할 수 있다. 증상이 나타날 경우 가능한 신속하게 히드로클로로티아지드 투여를 중단한다.

17) 인슐린이 조절되지 않을 경우 신중한 인슐린 또는 외과적 치료를 고려해야 한다. 폐색성 늑막증을 일으키는 위험인자로서 설본아미드 또는

페니실린 알레르기 병력 등이 포함될 수 있다.

5. 상호작용

1) 칸데사르탄 실렉세틸은 다른 약물과 임상적으로 유의성 있는 상호작용은 알려져 바 없다. 임상 약물동력학적으로 연구된 약물들은

히드로클로로티아지드, 외피린, 디곡신, 경구용 피판(에치닐베스트라디올/레보노르게스테일), 글리벤클라미드 및 니페디핀이다.

2) 칸데사르탄의 생체내이용률은 음식물의 영향을 받지 않는다.

3) 이 약의 항고혈압효과는 다른 고혈압 약제에 의해 증가될 수도 있다.

4) 히드로클로로티아지드의 칼륨 고갈작용과 칼륨 배설 및 저칼륨혈증과 관련된 다른 약물들에 의해 가증될 수 있다(예로 다른 칼륨 배출성

이노제, 하제, 이뇨제, 이뇨제, 카르복시콜론, 페니실린 G 나트륨, 살리실산 유도제).

5) Renin-angiotensin-aldosterone 계에 영향을 미치는 다른 약물들의 사용경험을 근거로 할 때 이 약과 칼륨 보존성 이노제, 칼륨보충제,

염 대체제 또는 혈중 칼륨 농도를 증가 시키는 약물(예 : 페리린 나트륨)과의 병용으로 혈중 칼륨 농도가 증가될 수 있다.

6) 이노제에 의한 저칼륨혈증이나 저마그네슘혈증은 다기탈리스 배당체나 항부정맥약물의 심독성을 증가시킬 수도 있다. 이 약을 이들 약물과

병용할 경우 혈중 칼륨농도를 주기적으로 모니터링하는 것이 좋다.

7) 혈중 리튬농도의 가역적인 증가와 독성이 ACE 저해제나 히드로클로로티아지드와 리튬의 병용시 보고되었다. 이 약과 병용시에 보고된 바는

없으나 유사한 효과가 나타날 가능성을 배제할 수 없으므로 병용시에는 혈중 리튬농도를 주의 깊게 모니터링하는 것이 좋다.

8) 히드로클로로티아지드의 이노제와, 나트륨 배설작용, 항고혈압효과는 비스테로이드성 소염진통제에 의해 감소될 수 있다.

9) 히드로클로로티아지드의 흡수는 colestipol이나 cholestyramine에 의해 감소된다.

10) 비탈분극성 근이완제(예 : tubocurarine)의 효과는 히드로클로로티아지드에 의해 증가될 수도 있다.

11) 치아자이드계 이노제는 칼륨의 배설을 감소시키므로 혈중 칼륨 농도를 증가 시킬 수 있다. 만일 칼륨 보충제나 비타민 D를 처방 해야만

하는 경우에는 혈중 칼륨농도를 모니터링하고 용량을 적절하게 조정해야 한다.

12) 메타치탄단제와 diazoxide의 혈당상승 효과는 치아자이드에 의해 증가될 수 있다.

13) 항콜린제에 : 아트로핀, 비페리덴)는 위장관계 운동성 및 위 배출율을 감소시키는 작용으로 인해 치아자이드계 이노제의 생체내이용율을

증가시킬 수 있다.

14) 치아자이드는 아만타딘에 의해 부작용의 위험이 증가할 수 있다.

15) 치아자이드계 약물은 세포독성 약물에 : 사이클로포스파이드, 메토트렉세이트)의 신장 배설을 감소시킬 수 있어 이들의 골수억제효과를

증가 시킬 수도 있다.

16) 저칼륨혈증의 위험은 스테로이드나 부신피질자극호르몬(ACTH)의 병용 중에 증가될 수 있다.

17) 기립성 저혈압은 알콜류, barbiturates 또는 마취제의 병용으로 악화될 수 있다.

18) 치아자이드계 이노제는 내당능을 순화시킬 수 있으므로 인슐린과 같은 항당뇨병약물의 용량조절이 필요할 수 있다.

19) 히드로클로로티아지트는 중증성 이뇨제에 : 아드레날린)의 반응을 감소시킬 수 있으나 중립 효과를 지닌 정도는 아니다.

20) 히드로클로로티아지트는 특히 고령층의 요도폐쇄 조영제와 병용시 급성 신부전의 위험을 증가 시킬 수 있다.

21) 히드로클로로티아지드 음식간에 임상적으로 유의성 있는 상호작용은 없다.

6. 일반적 주의사항

1) 이 약을 임신부에게 투여한 경험은 매우 제한되어 있으며, 임신 제1기 중에 투여했을 때 태아에 대한 잠재적인 위험성에 대해 결론 내리기는

불충분하다. 동물시험에서 칸데사르탄 실렉세틸은 말기 태아 및 신생아에서 신장에 대한 손상을 일으킨다. 그 기전은 renin-angiotensin-

aldosterone 계에 대한 영향에 의한 약물학적인 것으로 생각된다. 인체에서 태아의 신장 관류는 임신 제 27에 시작되는 RAS의 발달과

관련되어 있다. 따라서 이 약을 임신 제 2~3기 중에 투여할 경우 태아에 대한 위험은 증가한다. 임신 제 2~3기 중에 투여할 경우, RAS에

직접 작용하는 약물은 태아 및 신생아 손상(저혈압, 신기능 부전, 피로, 그리고/또는 무호, 양수과소증, 두개골 발육부전, 자궁내 성장 지체) 및

사망을 일으킬 수 있다. 폐 부전, 안면 비정상, 간지 근육의 경구가 있었다. 히드로클로로티아지트는 태반으로부터 혈액 흐름 뿐만 아니라

혈액관을 감소시킬 수 있어 신생아에서 혈소판 감소증을 야기할 수도 있다. 따라서 이 약은 임신 중에 사용해서는 안되며 만일 치료

에 임신상이 확인되면 이 약의 투여를 중단해야 한다.

2) 칸데사르탄이 인체 유증으로 분비되는 지에 대해서는 알려져 있지 않으나 쥐의 젖을 통해 분비된다. 히드로클로로티아지트는 모유를 통해

분비된다. 모유를 먹는 유아에게 부작용을 일으킬 가능성이 있으므로 이 약의 투여가 필수적일 때에는 수유를 중단해야 한다.

7. 과량투여시의 처치

1) 증상 : 약물학적인 근거로 볼 때 칸데사르탄의 과량투여로 인한 주 증상은 중상성 저혈압인 허기증일 것이다. 칸데사르탄 실렉세틸 672mg

까지 과량투여한 사례에서 회복이 되었다. 히드로클로로티아지드의 과량 투여로 인한 주 증상은 급성 체액 및 전해질 소실이다. 허기증,

저혈압, 구갈, 빈맥, 심실성 부정맥, 진전/의식의 손상, 근육경축과 같은 증상이 또한 나타날 수 있다.

2) 치료 : 이 약의 과량투여시 처치에 대한 특별한 정보는 없다. 그러나 과량투여시 다음과 같은 방법이 추천된다 : 과량투여시 구토 유도나

위세척을 고려해야 한다. 만일 중상성 저혈압이 발생하면 대동맥관을 실시하고 생명징후(맥박, 호흡, 체온 등)를 모니터링한다. 환자는

다리를 올린 양자위를 취하게 하고 만일 이것이 불충분하면 등장성 식염액을 주입하여 혈액량을 증가 시키어야 한다. 필요시 혈중 전해질과

산도균형을 체크하여 교정한다. 만일 위의 조치가 불충분할 경우 교감신경분흥성 약물을 투여할 수 있다. 칸데사르탄은 혈액투석으로

제거할 수 있고 히드로클로로티아지트는 혈액투석으로 제거되는지 알려져 있지 않다.

8. 기타

이 약이 운전 및 기계적 작동능력에 영향을 미치는지에 대해서는 연구된 바 없으나 이 약의 약물학적 특성을 볼 때 영향이 없을 것으로 생각된다.

운전자나 기계를 작동할 때에는 고혈압 치료 중에는 한기중이나 권태감이 때때로 발생할 수 있음을 고려해야 한다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로

원래의 용기에 보관한다.

【포장방법】 30정/병, 100정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 30℃이하 보관, 제조일로부터 36개월

※ 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약품을 통하여

교환하여 드립니다. 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실☎031-377-7909로 문의하시기 바랍니다.

※ 이 첨부서류 개정일자 이후 변경된 내용은 한진약품(주)홈페이지(www.hutecs.co.kr)에서 확인해 주십시오.

※ 부작용 이해구체 신청 : 한국약품안전관리센터☎644-6223

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

HUTEC S
한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

우송안전관리인증
KGMP 적격약제

설명서 작성일 : 120703

설명서 개정일 : 200306