

고단위 처방의 종합비타민 · 미네랄제제

메가토스씨정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

토코페롤아세테이트 2배산(KP).....	60mg
(비타민E로서 30IU)	
아스코르브산(KP).....	250mg
폴산(KP).....	0.4mg
티아민질산염(KP).....	15mg
리보플라빈(KP).....	15mg
니코틴아미드(KP).....	100mg
피리독신염산염(KP).....	20mg
시아노코발라민(KP).....	0.012mg
판토텐산칼슘(KP).....	20mg
황산아연수화물(KP).....	100mg
(아연으로서 22.5mg)	
첨가제 (타르색소: 적색3호, 적색40호	

【성 상】

황갈색의 내용물을 가진 장방형의 초코렛색 제피정 (앞 : TG 뒤 : MGC)

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

【용법 · 용량】

12세이상 및 성인 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산노증환자(hypercalcaemia : 뇨(소변)중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
- 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 (신장장애)환자
- 6) 저단백혈증 환자

3. 부작용(이상반응)

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - : 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(홍반)되어 붉어짐, 구역, 구토, 묽은 변, 위장관

(위창자)장애, 소화장애, 통증, 저혈압, 폐부종(폐부기)

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 파라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여 하지 않는다.
 - 가) 인산염 칼슘염, 경구(먹는)용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

90정(10정X9), 180정(90정X2) / PTP

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서개정 연월일 : 2017. 01. 04

제조 · 판매자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담 전화 080-300-8282

Ⓔ <http://www.taiguk.co.kr>